

新登場

水稲用初・中期一発処理除草剤



※200SD粒剤、ジャンボ®SD

ダンクショット®

フロアブル・200SD粒剤・ジャンボ®SD



難防除雑草に
狙い撃ち!



ドローン散布
(フロアブル、200SD粒剤)



周縁散布
(200SD粒剤)



水口施用(移植水稲)
(フロアブル、200SD粒剤)

リンズコア™が厄介な広葉雑草にナイスショット!



ノビエ



ホタルイ



ミズアオイ



イボクサ



クサネム

®は登録商標



NICHINO

日本農薬株式会社

ダンゴショット

フロアブル・200SD粒剤・ジャンボSD

TMが付記された表示は、コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社の商標です。

- 特長1 新規有効成分を配合!**
新規有効成分フロルピラウキシフェンベンジル(通称:リンズコア™)を配合した3成分の混合剤でノビエ、ホタルイ、広葉雑草に高い効果を示します。
- 特長2 すばやい効果発現!**
リンズコア™の特性により、速効的な効果を示します。
- 特長3 難防除雑草に高い効果を示す!**
ミズアオイやSU抵抗性広葉雑草、イボクサなどの雑草防除に有効です。

適用雑草および使用方法

2024年1月現在の登録内容

農林水産省登録:第24385号 ●安全性:普通物* ●有効成分カフェンストール:5.7%、フロルピラウキシフェンベンジル:0.94%、ベンゾピシクロン:3.8%

フロアブル	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カフェンストールを含む農薬の総使用回数
フロアブル	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤナカグサ	移植後3日～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	500ml /10a	1回	原液湛水散布、 水口施用又は 無人航空機による滴下	1回
	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	湛水直播の稲1葉期～ ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで			原液湛水散布 又は 無人航空機による滴下	3回以内

農林水産省登録:第24705号 ●安全性:普通物* ●有効成分カフェンストール:15.0%、フロルピラウキシフェンベンジル:2.5%、ベンゾピシクロン:10.0%

200SD粒剤	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カフェンストールを含む農薬の総使用回数
200SD粒剤	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤナカグサ	移植後3日～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	200g /10a	1回	湛水散布、湛水周縁散布、 水口施用又は 無人航空機による散布	1回
	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで			湛水散布、湛水周縁散布 又は 無人航空機による散布	3回以内

農林水産省登録:第24706号 ●安全性:普通物* ●有効成分カフェンストール:15.0%、フロルピラウキシフェンベンジル:2.5%、ベンゾピシクロン:10.0%

ジャンボSD	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カフェンストールを含む農薬の総使用回数
ジャンボSD	移植水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤナカグサ	移植後3日～ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装(パック) 10個 (200g) /10a	1回	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる	1回
	直播水稻	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで				

*毒劇物に該当しないものを指している通称

注意事項

鉄コーティング湛水直播には使用できません。

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失いしないよう散布してください。なお、多年生雑草は、生育段階によって効果がフシが出るので、必ず適期に散布するように注意してください(右記表参照)。
- オモダカ防除は、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の穂付けが均一となるように、整地、代かきはいいに行い、ワラくすなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にいいに行ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態のまま本剤を田面に均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は水深3～5cmの湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。(フロアブル)
- 散布に当たっては、水の出入りを止め水深5～6cmの湛水状態で投下し、散布後少なくとも3～4日間は水深3～5cmの湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。(200SD粒剤、ジャンボSD)
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田面に拡散させてください。処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達した時に必ず水を止め田面水があふれないように注意してください。(フロアブル、200SD粒剤)
- 湛水周縁散布の場合は、水田周縁部に沿って帯状に散布してください。(200SD粒剤)
- 小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。(ジャンボSD)
- 小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨等で破袋しないよう注意してください。(ジャンボSD)
- 直播水稻に使用する場合は、葉害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさけてください。
- 以下の水田では初期生育抑制を生じおそれがあるで使用をさけてください。
 - ①砂質土壌の水田及び漏水水田(減水深2cm/日以上)
 - ②軟弱低産苗を移植した水田
 - ③極端な浅植や深植した水田
- 葉類や表層に雑草の多発している水田では、拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるため使用をさけてください。(200SD粒剤、ジャンボSD)
- いぐさ、れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさの栽培予定水田では使用しないでください。

- 散布後の田面水を他作物に湛水しないでください。
- 無人航空機で滴下散布する場合は、次の注意を守ってください。
 - ①滴下散布は使用機種の使用基準に従って実施してください。(フロアブル、200SD粒剤)
 - ②滴下に当たっては散布装置のノズルを使用しないでください。(フロアブル)
 - ③作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行ってください。(フロアブル)
 - ④隣接する圃場に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による滴下には行わないでください。(フロアブル)
 - ⑤散布機種に適合した散布装置を使用してください。(200SD粒剤)
 - ⑥粒剤散布装置については、事前に薬剤の物理性に合わせてメタリング開度を調整するとともに、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラ(スピニング)の回転数を低速に調整してください。(200SD粒剤)
 - ⑦散布装置の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、ほ場の端から5m以上離れた位置からほ場内に散布してください。(200SD粒剤)
 - ⑧水源地、飲料水等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。(フロアブル、200SD粒剤)
 - ⑨葉剤滴下散布に使用した装置は十分に洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。(フロアブル、200SD粒剤)
 - ⑩滴下散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないでください。(フロアブル、200SD粒剤)
- 散布機、ホース、ノズル、タンク等の器具は、使用後速やかに十分に洗浄し、洗浄液は水田内で処理してください。また、使用した機器等は水稲用薬剤以外に使用しないでください。(フロアブル)
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で触らないでください。(ジャンボSD)
- 眼に対して弱い刺激性があるため眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗ししてください。(フロアブル)
- 眼に対して強い刺激性があるため眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を要してください。(200SD粒剤、ジャンボSD)
- 使用の際は保護眼鏡(200SD粒剤のみ)、農業用マスク、手袋、長スボン長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手洗、顔などを石けんでよく洗い、洗顔(200SD粒剤のみ)うがいをするともに衣服を交換してください。(フロアブル、200SD粒剤)
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。(フロアブル、200SD粒剤)
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。(フロアブル、200SD粒剤、ジャンボSD)
- 水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚池では使用しないでください。
- 水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 無人航空機による滴下散布で使用する場合は、河川、養魚池等に飛散しないよう特に注意してください。(フロアブル、200SD粒剤)
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ




NICHINO 東京都中央区
京橋1丁目
日本農薬株式会社 19番8号

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/
2024年1月作成版 (SPA)IW12401S