

ルミビア™ FS

種子処理用殺虫剤

「とうもろこし*」へ適用拡大!

*「未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)」が含まれます。

- ツマジロクサヨトウに優れた殺虫活性を持ち、効果は播種後21日程度持続します。
- 発芽して間もない幼苗段階を保護することで、収量の確保に貢献します。
- 飼料用とうもろこし、とうもろこし、いずれにもお使いいただけます。

動画でもご覧いただけます。




種子処理用殺虫剤

■適用害虫と使用方法(飼料用とうもろこし、とうもろこしのみ抜粋)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
飼料用とうもろこし(青刈り)	ツマジロクサヨトウ	乾燥種子 1000粒当り 原液1.5~2.5ml	は種前	1回	塗沫処理	1回
飼料用とうもろこし(子実)						4回以内 (は種前の塗沫処理は 1回以内、 は種後は3回以内)
とうもろこし						

その他の登録作物：稲(箱育苗)、直播水稻

■種子処理剤の使用手順



■上手な使い方

- 使用する前に、容器を良く振って薬液を混ぜてください。
- 処理する種子量が少ない場合は丈夫なポリ袋でも処理可能です。
- 他剤がコーティング処理された購入種子の上からでもルミビアFSを処理することが可能です。
- 初めて使用する際は、作物安全性確認の観点から、小規模の予備試験をお勧めいたします。

使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器をよく振ってください。
- 薬剤が種子に均一に付着するように処理してください。
- 本剤で処理した種子等は食料や動物飼料として用いないでください。
- 使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 使用の際は不浸透性手袋などを着用してください。
- 魚毒性等：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。
- 保管：直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。
 ●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2024年11月末日現在の知見に基づき、作成されています。



販売:  **NICHINO** 東京都中央区
 日本農薬株式会社 京橋1丁目
 19番8号
 TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

製造: コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2024年11月作成版(CO)JE12411S