

ルミビア™ FS

種子処理用殺虫剤

稻(箱育苗)「イネツトムシ」、
直播水稻「フタオビコヤガ、イネドロオイムシ」へ適用拡大!

- 水稻的主要害虫であるフタオビコヤガ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対し優れた効果が長期間続きます。
- 農閑期に処理ができ、年間の作業分散が可能です。
- 有用昆虫への影響がほとんどありません。



画期的な種子処理技術で、
防除をもっとシンプルに。

種子処理用殺虫剤

■ 適用害虫と使用方法(水稻のみ抜粋)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稻(箱育苗)	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ コブノメイガ フタオビコヤガ イネツトムシ	乾燥種もみ 1kg当り 原液4~7ml	は種前 (浸種前)	1回	種子吹き付け処理 又は塗沫処理	1回
直播水稻	イネミズゾウムシ フタオビコヤガ イネドロオイムシ		は種前			

その他の登録作物:飼料用とうもろこし(青刈り、子実)、とうもろこし

■ 種子処理剤の使用手順



■ 上手な使い方

- 使用する前に、容器をよく振って薬液を混せてください。
- 乾もみ1kgに対し、薬液+水の合計が30mlになるように調製することで、処理ムラを防ぐことができます。(10kg未満の少量の乾もみを処理する場合は水量を減らすなど適宜ご調整ください。)
- 一度に30kg以上の種もみを処理する場合は、薬液を2~3回に分け、攪拌しながら注ぐと均一に処理できます。
- 効果を安定させるため、種子処理後に行う種子消毒や芽出しを目的とした浸漬・浸種期間中の水交換は4回までとしてください。かけ流しは避けてください。

使用上の注意

- 使用量に合わせて秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器をよく振ってください。
- 薬剤が種子に均一に付着するように処理してください。
- 本剤で処理した種子等は食料や動物飼料として用いてください。
- 使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責

任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 使用の際は不透性手袋などを着用してください。
- 魚毒性等: 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。
- 保管: 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

● ラベルをよく読んでください。 ● 記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。
 ● 空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ● 防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2024年11月末日現在の知見に基づき、作成されています。



販売:  NICHINO
日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL:0570-09-1177 URL:<https://www.nichino.co.jp/>

製造: コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2024年11月作成版(CO)JD1241S