



無人航空機散布に対応



適用拡大

かんきつ/ミカンガタムシ
無人航空機散布(16倍、3.2ℓ/10a)
キャベツ、ブロッコリー、はくさい
レタス、非結球レタス、ねぎ



<写真はイメージです>

害虫防除へ パワー全開!!



殺虫剤

アクセル[®] プロアブル

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!



適用作物		
● うめ	● アスパラガス	● かんしょ
● かんきつ	● ねぎ	● さといも
● キウイフルーツ	● えだまめ	● かぶ
● キャベツ	● だいず	● ごぼう
● はくさい	● とうもろこし	● しょうが
● レタス	● 飼料用	● だいこん
● 非結球レタス	● とうもろこし(子実)	● にんじん
● 非結球あぶらな科	● トマト	● 花き類・観葉植物
● 葉菜類	● ミニトマト	● 樹木類
● ほうれんそう	● ピーマン	● たばこ
● ブロッコリー	● なす	
● カリフラワー	● 食用ミニバラ	



特長

- 1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効!
- 2 害虫からの食害を停止させます!
- 3 ローテーション防除に活用しやすい!

適用病害虫および使用方法

が2023年11月に適用拡大になりました。

<2023年11月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	収穫7日前まで	※1	散布	3回以内
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ、ミカンナガタムシ	1000~4000倍					
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a	3回以内	※1	散布	3回以内
うめ	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a				
とうもろこし、飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ						
アスパラガス	ツマジロクサヨトウ	1000倍	100~800ℓ/10a				
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a				
トマト、ミニトマト	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍					
ピーマン	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a				
なす	トマトキバガ	1000倍					
にんじん	オオタバコガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a				
	オオタバコガ、ニジウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ	1000倍					
ねぎ	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	2回以内	※2	散布	2回以内
	シロイチモジヨトウ	8倍					
		10倍					
		16倍					
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a	3回以内	※2	散布	3回以内
	ウリハムシモドキ	1000倍					
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000~2000倍					
キャベツ	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	収穫前日まで	※2	散布	3回以内
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類						
	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類						
はくさい	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	3回以内	※2	散布	3回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類						
	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ						
	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ						
レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類	1000~2000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	2回以内	※2	散布	2回以内
	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	8倍					
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類	10倍					
		16倍					
非結球レタス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	2回以内	※2	散布	2回以内
		8倍					
		10倍					
		16倍					
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ	1000倍	100~300ℓ/10a	2回以内	※2	散布	2回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍					
	コナガ	1000倍					
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	8倍					
ブロッコリー	コナガ	1000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a 3.2ℓ/10a	3回以内	※2	散布	3回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	1000倍					
		10倍					
		16倍					
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、キスジノミハムシ	1000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	※2	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					
	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000倍					
	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ類	1000~2000倍					
だいこん	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	※2	散布	3回以内
かぶ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍					
えだまめ	ハスモンヨトウ	1000~2000倍					
だいず	フタスジヒメハムシ	1000倍					
しょうが	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	1000~2000倍	0.8~1.6ℓ/10a	収穫前日まで	※2	散布	3回以内
		16倍					
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	10~16倍	100~300ℓ/10a	発生初期	※1	散布	6回以内
	ヨツモンカメノコハムシ	1000~2000倍					
さといも	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	200~700ℓ/10a	成虫発生直前~成虫発生期	※3	散布	6回以内
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍					
きく	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	1000~2000倍	200~700ℓ/10a	成虫発生直前~成虫発生期	※3	散布	6回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)	オオタバコガ	1000倍					
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	1000~4000倍	5~200ℓ/10a	-	-	散布	2回以内
		1000倍					
さくら	クビアカツヤカミキリ	200倍	-	-	-	散布	2回以内
		1000倍					
たばこ	ヨトウムシ	1000~2000倍	25~180ℓ/10a	収穫10日前まで	※1	散布	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍			※3		

※1:主幹から株元に散布 ※2:無人航空機による散布 ※3:木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

■使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にからならないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にからならないようにしてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種に準拠して実施してください。
 - ②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ④散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - ①使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ②機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指示を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等て使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

2023年11月作成版 (ZN)AD12311S