



無人航空機散布に対応



適用拡大

かんきつ/無人航空機散布
うめ/全面土壌散布



〈写真はイメージです〉

害虫防除へ パワー全開!!



殺虫剤

アケセル[®] プロアブル

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



タマナギンウバ



コナガ



トマトキバガ



キスジノミハムシ



ヨツモンカメノコハムシ



カブラハバチ



ゴマダラカミキリ



クビアカツヤカミキリ

適用作物

- うめ
- ブロccoli
- なす
- かんきつ
- カリフラワー
- 食用ミニバラ
- キウイフルーツ
- アスパラガス
- かんしょ
- もも類
- ねぎ
- さといも
- すもも
- えだまめ
- かぶ
- キャベツ
- だいず
- ごぼう
- はくさい
- とうもろこし
- しょうが
- レタス
- 飼料用 とうもろこし
- だいこん
- 非結球レタス
- とうもろこし(子実)
- にんじん
- 非結球あびらな科
- トマト
- 花き類・観葉植物
- 葉菜類
- ミニトマト
- 樹木類
- ほうれんそう
- ピーマン
- たばこ



特長

1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効!

2 害虫からの食害を停止させます!

3 ローテーション防除に活用しやすい!

適用病害虫および使用方法

が2024年12月に適用拡大になりました。

<2024年12月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ、ミカンナガタムシ	1000~4000倍	200~700ℓ/10a			散布	
	ゴマダラカミキリ、アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ、ミカンナガタムシ	12倍	4~8ℓ/10a			※2	
		15倍	8~10ℓ/10a				
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a	2回以内	3回以内	散布	4回以内 (樹幹散布は2回以内、 散布は2回以内)
	クビアカツヤカミキリ	100~200倍	5~200ℓ/10a			樹幹散布	
もも類 すもも	ケムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a	3回以内	3回以内	散布	3回以内
	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a			全面土壌散布	
うめ	ケシクスイ類	1000倍	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内	散布	3回以内
	アワノメイガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a			散布	
とうもろこし、 飼料用とうもろこし(子実)	ツマジロクサオトウ	1000倍	100~800ℓ/10a	3回以内	3回以内		散布
	アスパラガス	1000~2000倍	100~800ℓ/10a				
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ/10a	2回以内	2回以内	※2	2回以内
	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍	1.6ℓ/10a				
トマト、ミニトマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	トマトキバガ	1000倍	3.2ℓ/10a				
ピーマン	オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ	1000倍	2ℓ/10a				
なす	オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ	1000倍	2ℓ/10a				
にんじん	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		1000倍	1.6ℓ/10a				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		10倍	3.2ℓ/10a				
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000倍	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ウリハムシモドキ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a				
キャベツ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ハイマダラメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウバノ類	1000~2000倍	3.2ℓ/10a				
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	8倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウバノ類	10倍	2ℓ/10a				
レタス	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	8倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類	10倍	2ℓ/10a				
レタス	コナガ、アオムシ、ハイマダラメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類	1000~2000倍	1.6ℓ/10a				
非結球レタス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	8倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		10倍	3.2ℓ/10a				
カリフラワー	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		8倍	2ℓ/10a				
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ	1000倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000~2000倍	3.2ℓ/10a				
ブロッコリー	コナガ	1000倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	8倍	2ℓ/10a				
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、キスジノミハムシ	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍	1.6ℓ/10a				
だいこん	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000倍	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ハイマダラメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ類	1000~2000倍	2ℓ/10a				
かぶ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a				
えだまめ	ハスモンヨトウ	1000倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	フタスジヒメハムシ	1000~2000倍	3.2ℓ/10a				
しょうが	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	1000~2000倍	0.8~1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	10~16倍	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	ヨツモンカメノコハムシ	1000~2000倍	2ℓ/10a				
さといも	ハスモンヨトウ	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a				
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍	2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	1000~2000倍	3.2ℓ/10a				
きく	オオタバコガ	1000倍	1.6ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ	1000~2000倍	2ℓ/10a				
花き類・観葉植物(きくを除く)	オオタバコガ	1000倍	3.2ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
	オオタバコガ	1000~2000倍	1.6ℓ/10a				
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	1000~4000倍	200~700ℓ/10a	3回以内	3回以内	※2	2回以内
		1000倍	1.6ℓ/10a				
さくら	クビアカツヤカミキリ	200倍	5~200ℓ/10a	3回以内	3回以内	※1	2回以内
		1000倍	—				
たばこ	ヨトウムシ	1000~2000倍	—	3回以内	3回以内	※3	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍	25~180ℓ/10a				

※1:主幹から株元に散布 ※2:無人航空機による散布 ※3:木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害部である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- うめに全面土壌散布する場合は、適度な降雨等により土壌に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさけてください。
- すももに樹幹散布で使用する場合は、薬液が果実にかかると汚れを生じさせるおそれがあるので果実からなるべく十分に注意してください。
- みずかけな(水耕菜)、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の養蜂にからないようにしてください。

- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散によって自動車やカトラクタンの塗装等に被害を生じることがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - ①使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ②機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指導を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手洗、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう隣町いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

LINE公式アカウントをはじめました!

友だち募集中 最新情報をLINEで配信!

@nichino

NICHINO 東京都中央区 京橋1丁目 19番8号

日本農薬株式会社

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>

2024年12月作成版 (ZNIAD12412S)