農林水産省登録
第２２４６１号

無人航空機散布に対応

適用拡大
もも類
（ハマキムシ類
コスカシバ）

〈写真はイメージです〉

害虫防除へ パワー全開!!

殺虫剤

アクセル® フロアブル

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!

ハスモンヨトウ

オオタバコガ

タマナギンウワバ

コナガ

トマトキバガ

キスジノミハムシ

ヨツモンカメノコハムシ

カブラハバチ

ゴマダラカミキリ

クビアカツヤカミキリ

適用作物

- うめ
- かんきつ
- キウイフルーツ
- もも類
- すもも
- キャベツ
- はくさい
- レタス
- 非結球レタス
- 非結球あぶらな科葉菜類
- ほうれんそう
- ブロッコリー
- カリフラワー
- アスパラガス
- ねぎ
- えだまめ
- だいず
- とうもろこし
- 飼料用とうもろこし(子実)
- トマト
- ミニトマト
- ピーマン
- なす
- 食用ミニバラ
- かんしょ
- さといも
- かぶ
- ごぼう
- しょうが
- だいこん
- にんじん
- 花き類・観葉植物
- 樹木類
- たばこ

NICHINO
日本農薬株式会社

Ⓡは日本農薬(株)の登録商標

アクセル® 殺虫剤 フロアブル

有効成分：メタフルミゾン…25.0%　殺虫剤分類　22B
安 全 性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特長
1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効！
2 害虫からの食害を停止させます！
3 ローテーション防除に活用しやすい！

適用病害虫および使用方法

が2026年1月に適用拡大になりました。

<2026年1月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5～200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内
		1000～4000倍	200～700ℓ/10a			散 布	
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ、ミカンナガタマムシ	1000～2000倍					
	ゴマダラカミキリ、アゲハ類、ヨモギエダシャク クワノミハムシ、ミカンナガタマムシ	12倍	4～8ℓ/10a			※2	
		15倍	8～10ℓ/10a				
		24倍	10～16ℓ/10a				
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで		散 布	
もも類	クビアカツヤカミキリ、ケムシ類、ハマキムシ類				2回以内		4回以内 （樹幹散布は2回以内、散布は2回以内）
	クビアカツヤカミキリ	100～200倍	5～200ℓ/10a			樹幹散布	
	コスカシバ	100倍					
すもも	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700ℓ/10a			散 布	
		100～200倍	5～200ℓ/10a			樹幹散布	
うめ	ケムシ類	1000倍	200～700ℓ/10a			散 布	
	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ						
	ケシキスイ類	1000～2000倍			3回以内		3回以内
とうもろこし、飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ	1000倍	100～300ℓ/10a			全面土壌散布	
		1000～2000倍				散 布	
	ツマジロクサヨトウ	16倍	1.6～3.2ℓ/10a			※2	
		1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
		16倍	3.2ℓ/10a			※2	
アスパラガス	ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～800ℓ/10a			散 布	
ごぼう	ヒョウタンゾウムシ類	1000倍	100～300ℓ/10a				
トマト、ミニトマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍					
	トマトキバガ	1000倍					
ピーマン	オオタバコガ	1000～2000倍					
なす	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ						
にんじん	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8倍	1.6ℓ/10a		2回以内	※2	2回以内
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	3回以内
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000～2000倍			3回以内		
	ウリハムシモドキ	1000倍					
キャベツ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ						
	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類	1000～2000倍					
	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類	8倍	1.6ℓ/10a			※2	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
はくさい	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類	8倍	1.6ℓ/10a				
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ類	1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
		1000～2000倍					
レタス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	8倍	1.6ℓ/10a			※2	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
		1000～2000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
非結球レタス		8倍	1.6ℓ/10a		2回以内	※2	2回以内
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
ブロッコリー	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍					
	コナガ	1000倍					
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	8倍	1.6ℓ/10a			※2	
		10倍	2ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、キスジノミハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a		3回以内	散 布	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					
だいこん	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ類	1000～2000倍					
	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ類	8倍	0.8ℓ/10a			※2	
		10倍	1.0ℓ/10a				
		16倍	1.6ℓ/10a				
		20倍	2.0ℓ/10a				
かぶ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで		散 布	
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
		8倍	0.8～1.6ℓ/10a			※2	
		10倍	1.0～2.0ℓ/10a				
		16倍	1.6～3.2ℓ/10a				
	フタスジヒメハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
		8倍	1.6ℓ/10a			※2	
		10倍	2.0ℓ/10a				
		16倍	3.2ℓ/10a				
しょうが	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
		16倍	3.2ℓ/10a			※2	
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、ヨツモンカメノコハムシ	10～16倍	0.8～1.6ℓ/10a				
		1000～2000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
さといも	ハスモンヨトウ	10倍	1.0～1.6ℓ/10a			※2	
		20倍	2.0～3.2ℓ/10a				
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍	100～300ℓ/10a			散 布	
きく	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍					
花き類・観葉植物（きくを除く）	オオタバコガ	1000倍		発生初期	6回以内		6回以内
樹木類（さくらを除く）	ケムシ類	1000～4000倍	200～700ℓ/10a				
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍		成虫発生直前～成虫発生期			
		200倍	5～200ℓ/10a			※1	
		100倍	―	―		※3	
たばこ	ヨトウムシ	1000～2000倍	25～180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散 布	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍					

※1：主幹から株元に散布　※2：無人航空機による散布　※3：木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
  - 樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
  - 散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- うめに全面土壌散布する場合は、適度な降雨等により土壌に薬液が染み込みづらい条件では効果に影響を及ぼすおそれがあるので、使用をさけてください。
- すももに樹幹散布で使用する場合、散布液が果実にかかると汚れを生じるおそれがあるので果実にかからないように十分注意してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
  - 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
  ①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。②散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  ④散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
  ⓐ使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
  ⓑ機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも使用当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

LINE公式アカウントはじめました！
友だち募集中　最新情報をLINEで配信！
@nichino

NICHINO
日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL：0570-09-1177　URL：https://www.nichino.co.jp/

2026年1月作成版（ZN）AD12601S