インダー™ フロアブル

園芸用殺菌剤

❶ 予防効果と治療効果

予防に加え治療効果に優れ、初期感染時の散布でも病斑の進展を防ぎます。

❷ 収穫前日まで使える

うめ、もも、ネクタリン、すもも、おうとうでは、収穫前日まで使えます。

❸ 果実汚れが少ない

低濃度で散布でき、薬液による作物への汚れがほとんどありません。

「うめ」の病害防除には インダーフロアブル。

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

インダー™フロアブル

園芸用殺菌剤

■農林水産省登録：第20616号
■有効成分：フェンブコナゾール･･･22.0%
■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

殺菌剤分類 3

■適用病害と使用方法（抜粋）

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数
うめ	黒星病 すす斑病	5,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

●うめ・黒星病に対する効果　平成5年 徳島県果樹試験場県北分場

薬剤名	希釈倍数	発病果率（%）	防除価
インダーフロアブル	5,000倍	2.1	98.4
A水和剤	3,000倍	4.2	95.4
Bフロアブル	400倍	19.5	66.8

■品種：鶯宿　樹齢8年生
■区制：1区1樹4連制
■発生状況：多発生
■処理：4/26、5/6、5/27に動力噴霧機にて十分量を散布
■調査：6/3に1樹当たり200果について発病果数と薬害の有無を調査

●うめ・すす斑病に対する効果　平成20年 和歌山県植物防疫協会



■品種：南高（6年生）
■区制：1区4樹（A水和剤は3樹）
■発生状況：小発生
■処理：5/8、22、6/6に400ℓ/10a散布
■調査：6/19全果実を調査

■インダーフロアブルの希釈早見表（必要な薬量）

このように薄めればいインダー

希釈倍数＼希釈水量	300ℓ	500ℓ	600ℓ	1,000ℓ
5,000倍	60mℓ	100mℓ	120mℓ	200mℓ
8,000倍	37.5mℓ	62.5mℓ	75mℓ	125mℓ
10,000倍	30mℓ	50mℓ	60mℓ	100mℓ
12,000倍	25mℓ	42mℓ	50mℓ	83mℓ

●幅広い果樹に使える！
●優れた予防効果と治療効果！
●低濃度でよく効く！

⚠ 使用上の注意

・貯蔵中に分離することがあるので、使用に際してはよく振ってください。
・使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

・誤飲に注意してください。誤飲の場合には、吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせてください。
・散布の際は、保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
・密栓し、食品と区別して、直射日光を避け、なるべく低温な場所に保管してください。

●使用前には、ラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。　●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。

販売：NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177　URL:https://www.nichino.co.jp/

製造：コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2025年10月作成（CO）HU12510S