

殺菌剤

農林水産省登録 第19252号



モンカット[®] フロアブル40

てんさい

ねぎ

優れた効果！
白絹病に
リゾトニア性病害、

キャベツ

レタス

ばれいしょ

畑わさびに
適用拡大！



(写真はイメージです)



キャベツ株腐病



しょうが紋枯病



レタスすそ枯病



ねぎ白絹病



てんさい葉腐病

®は日本農薬(株)の登録商標



NICHINO

日本農薬株式会社

モンカットフロアブル40は、
「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載

リゾクトニア性病害、白絹病に優れた効果！

殺菌剤

モンカット[®] フロアブル40

有効成分：フルトラニル……………40.0%

殺菌剤分類 7

安全性：普通物（毒劇物に該当しないもの）
（指している通称）

特長

1 予防・治療2つの作用を有します。

2 浸透移行性に優れ、安定した効果を示します。

3 効果が長期間持続します。

4 耐雨性に優れます。

5 薬害の心配が少ない薬剤です。

適用病害虫および使用方法（が2024年10月に適用拡大になりました）

2024年10月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数		
稲	紋枯病	2000倍	60～150ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内		
キャベツ	株腐病		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで			7回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は2回以内、 散布は4回以内）		
しょうが	紋枯病			6回以内			5回以内 （植付時の処理は1回以内、 植付後は4回以内）		
葉しょうが				4回以内					
レタス	白絹病	1000～2000倍		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	5回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内）		
非結球レタス	すそ枯病		4回以内					6回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は1回以内、 散布は4回以内）	
	白絹病								株元散布
ねぎ									
にら	白絹病	3ℓ/m ²		収穫30日前まで	1回	2回以内 （種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内）			
みょうが(花穂)	紋枯病		収穫14日前まで						
みょうが(莖葉)			収穫3日前まで みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない 場合にあつては開花期終了まで	3回以内			土壌灌注	3回以内	
きゅうり トマト	苗立枯病 (リゾクトニア菌)		1000～2000倍	は種時～子葉展開時				1回	2回以内 （種子粉衣は1回以内、 土壌灌注は1回以内）
畑わさび	苗立枯症 (リゾクトニア菌)	2000倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り0.5ℓ	収穫30日前まで	2回以内	灌注		3回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内）	
			セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ	は種時～育苗期前半					
				植替時					
				植替時					
にら(花莖)	茎腐病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	株元散布	4回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内）		
ししとう	白絹病		1ℓ/株			株元灌注			
ばれいしょ	黒あざ病	100～200倍	—	植付前	1回	瞬時～10分間 種いも浸漬	1回		
		20倍	種いも100kg当り3ℓ			散布			
		250倍	種いも100kg当り 200～300mℓ						
てんさい	葉腐病	250倍	25ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	7回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の灌注は1回以内、 散布は5回以内）		
	根腐病	1000倍	100～300ℓ/10a						
		200倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ(3ℓ/m ²)	定植前	1回	灌注			
とうもろこし	紋枯病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
花き類・観葉植物	白絹病	1000～2000倍	3ℓ/m ²	発病初期		株元散布			
樹木類	くもの巣病	1000倍	200～700ℓ/10a	発芽後(発病初期)		土壌灌注			
						散布			
えぞまつ(苗木) とどまつ(苗木)	苗立枯病 (リゾクトニア菌)		3ℓ/m ²			苗木兼 全面土壌散布			

注意事項

- カラー、花はすに使用する場合は、湿水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 室に対して影響があるので、周辺の葉にはかからないようにしてください。
- 散布する場合は、散布液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生ずるおそれがあるので注意してください。
- てんさいに希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置を用いて葉面に均一に散布してください。
- ばれいしょの種いもに処理する場合、所定濃度の薬液で種いも

浸漬または散布し、風乾後植付けてください。

- ばれいしょの種いもに希釈倍数20倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを用いて均一に散布してください。
- 畑わさびの植替時に使用する場合は、苗を育苗箱又はセル成型育苗トレイ等に植え替えた後に、灌注してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意して

ください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 使用の際は不浸透性手袋等を着用してください。また、作業後は洗眼してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中および使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。



LINE公式アカウントはじめました！
友だち募集中 最新情報を
LINEで配信！



@nichino



NICHINO
日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>
2024年10月作成版 (Z) AL12410S