

殺菌剤

モンカッポ® フロアブル40

てんさい

ねぎ

優れた効果！
白絹病に
リゾクトニア性病害、

キャベツ

レタス

ばれいしょ

非結球レタス
にら
とうもろこし
に適用拡大！

(写真はイメージです)



キャベツ株腐病



しょうが紋枯病



レタスすそ枯病



ねぎ白絹病



てんさい葉腐病



NICHINO

日本農薬株式会社

殺菌剤

リゾクトニア性病害、白絹病に優れた効果！

モンカット® フロアブル40

有効成分：フルトラニル……………40.0%

殺菌剤分類 7

安全性：普通物（毒劇物に該当しないもの）
（を指すという通称）

特長

1 予防・治療2つの作用を有します。

2 浸透移行性に優れ、安定した効果を示します。

3 効果が長期間持続します。

4 耐雨性に優れます。

5 薬害の心配が少ない薬剤です。

適用病害虫および使用方法（が2023年11月に適用拡大になりました）

2023年11月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数		
稲	紋枯病	2000倍	60～150ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内		
キャベツ	株腐病		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで			7回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は2回以内、 散布は4回以内）		
しょうが	紋枯病			6回以内			6回以内		
葉しょうが				4回以内			5回以内 （植付時の処理は1回以内、 植付後は4回以内）		
レタス	白絹病	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	株元散布	5回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は1回以内、 散布は3回以内）		
非結球レタス	すそ枯病						6回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の土壌混和は1回以内、 散布は4回以内）		
ねぎ	白絹病			2000倍	土寄せ時 但し、 収穫30日前まで		4回以内	5回以内 （種子粉衣は1回以内、 全面土壌散布及び株元散布は 合計4回以内）	
	オオシロカラカサタケ				収穫30日前まで			2回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種後は1回以内）	
にら	白絹病	3ℓ/m ²	収穫14日前まで	1回	3回以内	土壌灌注	2回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種後は1回以内）		
みょうが(花穂)	紋枯病		収穫3日前まで	1回		土壌灌注	3回以内		
みょうが(茎葉)			みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない 場合にあっては開花期終了まで					は種時～子葉展開時	2回以内 （種子粉衣は1回以内、 土壌灌注は1回以内）
きゅうり トマト			苗立枯病 (リゾクトニア菌)					1000～2000倍	収穫30日前まで
畑わさび	茎腐病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	株元灌注	4回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内）		
にら(花莖)	白絹病	1000倍	1ℓ/株						
ししとう									
ばれいしょ	黒あざ病	100～200倍	—	植付前	1回	瞬時～10分間 種いも浸漬	1回		
		20倍	種いも100kg当り 200～300mℓ			散布			
		250倍	25ℓ/10a						
てんさい	葉腐病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	1回	灌注	7回以内 （種子粉衣は1回以内、 定植前の灌注は1回以内、 散布は5回以内）	
	根腐病	200倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ(3ℓ/m ²)	定植前					
とうもろこし	紋枯病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
花き類・観葉植物	白絹病	1000～2000倍	3ℓ/m ² 200～700ℓ/10a	—		株元散布			
樹木類	くもの巣病	1000倍	3ℓ/m ² 200～700ℓ/10a	発病初期		土壌灌注			
			えぞまつ(苗木) とどまつ(苗木)	苗立枯病 (リゾクトニア菌)		3ℓ/m ²		発芽後(発病初期)	苗木兼 全面土壌散布

注意事項

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 散布する場合は、散布液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生ずるおそれがあるので注意してください。
- てんさいに希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置を用いて葉面に均一に散布してください。
- ばれいしょの種いもに処理する場合、所定濃度の薬液で種いも浸漬または散布し、風乾後植付けてください。

- ばれいしょの種いもに希釈倍数20倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを用いて均一に散布してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 使用の際は不浸透性手袋等を着用してください。また、作業後は洗眼してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中および使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね！



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

2023年11月作成版 (Z)AL12311S

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号