

水稻育苗箱専用 殺虫殺菌剤

病害虫から稲を守る育苗戦隊結成！

新登場

ファイゲット® ハコレンジャー® L粒剤

高密度播種
対応

WCS用稲
にも使えます※

新規有効成分ピラキサルト™が
抵抗性ウンカを撃退！

ウンカ類
(トビイロウンカ)



4つの有効成分

リナキシピル

ピラキサルト

チアジニル

チフルザミド



イネミズウムシ



イネドロオイムシ



ツマグロヨコバイ



コブノメイガ



イネツトムシ



いもち病



白葉枯病



紋枯病



NICHINO

日本農薬株式会社

※「稲発酵粗飼料生産・給与技術
マニュアル」に記載

powered by
RYNAXYPYR®
ACTIVE INGREDIENT

Pyraxalt® active



水稻育苗箱専用殺虫殺菌剤

ブイゲット® ハコレンジャー® L粒剤

ブイゲット®/ハコレンジャー®は日本農薬(株)の登録商標、
RYNAXYPYR®はFMCコーポレーションまたはその米国
およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標
Pyrexalt™/activeはコルテバ・アグリサイエンスならびにその
関連会社の登録商標

有効成分:クロラントラニプロール…0.75% [殺虫剤分類 28]

トリフルメゾピリム…0.75% [殺菌剤分類 4E]

チアジニル…6.0% [殺菌剤分類 P3]

チフルザミド…3.0% [殺菌剤分類 7]

安 全 性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

特 長

育苗箱処理でいもち病、紋枯病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病および、水稻主要害虫(ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、コブノメイガなど)を同時防除できます。

ブイゲット(チアジニル)

いもち病、細菌病
稲の病害防御機能を
増強し、安定した効果
を発揮

チフルザミド

紋枯病
紋枯病の菌核発芽、進展、
形成を阻害し、高い効果と
優れた効果持続性を発揮

クロラントラニプロール (リナキシビル™)


チョウ目害虫、初期害虫など
チョウ目害虫に優れた効
果持続性を発揮、幅広い
初期害虫にも有効

トリフルメゾピリム (ピラキサル™)

ウンカ類
トビイロウンカ等のウン
カ類に極めて高い効果、
既存剤抵抗性ウンカ類
にも有効

試験成績


ウンカ類(トビイロウンカ)



ブイゲット
ハコレンジャーL粒剤

日本農薬(株)総合研究所/熊本(2014年)
品種:ヒノヒカリ 移植:6/27 処理:6/27(移植当日)
調査:9/16(移植81日後) 発生状況:少発生

紋枯病



ブイゲット
ハコレンジャーL粒剤

日本農薬(株)総合研究所/大阪(2015年)
品種:ヒノヒカリ 移植:5/29 処理:5/29(移植当日)
調査:9/18(移植112日後) 発生状況:中発生

適用病害虫および使用方法

(2022年1月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数	チフルザミドを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病、紋枯病、白葉枯病、もみ枯細菌病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、フタオビコヤガ	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50~100g) 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50g	緑化期 ~ 移植当日	1回	本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する	1回	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	内穎褐変病	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50~100g)	移植3日前 ~ 移植当日						
稲	ウンカ類、コブノメイガ	1kg/10a	移植時		側条施用			3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

注意事項

- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機で移植してください。
- イネ葉が濡れている場合には、散布前に葉に付いている露を払い落としてから薬剤を散布してください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- 軟弱徒長苗、ムレ苗又は苗の生育が不良な場合には、葉害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粕として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの葉量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 本田の整地が不均整な場合は、葉害を生じるおそれがあるので、代かきは丁寧に、移植後に田面が露出しないよう注意してください。
- さく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布してください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。また、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

2023年6月作成版(SPA)FG12306S

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号