# クリンチャー™

## 水稲用除草剤

### ノビエと難防除雑草の対策に。

・大きなノビエもすばやく枯らす。
・ノビエは枯らすが、イネには高い安全性。
・降雨、減水の影響を受けにくい安定した効果。
（クリンチャーバスME液剤は除く）

＊農林水産省HP「WCS用稲に使用できる農薬のリスト」で使用できる農薬として記載されています。

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

## ■クリンチャー™シリーズの適用雑草と使用方法

※本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

# 1キロ粒剤

4葉まで 1kg 直播は3葉期まで　5葉まで 1.5kg 直播は4葉期まで　湛水散布　無人航空機も可　飼料米OK　WCS OK

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り使用量 | 総使用回数※ | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | ノビエ<br>キシュウスズメノヒエ<br>アゼガヤ | 移植後7日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで | 1kg | 本剤　2回以内<br>シハロホップブチル<br>3回以内 | 湛水散布または<br>無人ヘリコプターによる<br>散布 |
| | | 移植後25日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 1.5kg | | |
| 直播水稲 | ノビエ | 播種後10日～ノビエ3葉期<br>但し、収穫30日前まで | 1kg | | |
| | | 播種後25日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで | 1.5kg | | |

■農林水産省登録:第19190号 ■有効成分:シハロホップブチル…1.8% ■性状:類白色細粒　除草剤分類 1

# EW

6葉まで　茎葉散布　茎葉散布　落水　落水散布　湛水散布　無人航空機も可　展着剤　展着剤加用　育苗箱OK　飼料米OK　WCS OK

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り使用量(希釈水量)<br>または希釈倍数(散布液量) | 総使用回数※ | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | ノビエ<br>キシュウスズメノヒエ<br>アゼガヤ | 移植後20日～ノビエ6葉期<br>但し、収穫30日前まで | 100mℓ(25～100ℓ) | 本剤　2回以内<br>シハロホップブチル　3回以内 | 湛水散布または<br>落水散布 |
| | ノビエ | 移植後20日～ノビエ4.5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 100mℓ(0.8～1.6ℓ) | | 無人航空機<br>による散布 |
| 直播水稲 | 一年生イネ科雑草 | 播種後10日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 100mℓ(25～100ℓ) | | 雑草茎葉散布<br>または全面散布 |
| | | 播種後10日～ノビエ4.5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 100mℓ(0.8～1.6ℓ) | | 無人航空機<br>による散布 |
| 稲(箱育苗) | ノビエ | 播種後10日～ノビエ5葉期 | 1,000倍<br>〔育苗箱(30×60cm)当り18mℓ〕 | 本剤　1回<br>シハロホップブチル　3回以内 | 雑草茎葉散布<br>または全面散布 |

■農林水産省登録:第19195号 ■有効成分:シハロホップブチル…30.0% ■性状:類白色粘稠乳濁液体　除草剤分類 1

# バスME液剤

5葉まで　茎葉散布　茎葉散布　落水　落水散布　湛水散布　展着剤　展着剤不加用　飼料米OK 但し出穂前まで　WCS OK

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10アール当り<br>使用量(希釈水量) | 総使用回数※ | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、<br>ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、<br>オモダカ、セリ、クログワイ、コウキヤガラ、<br>シズイ、キシュウスズメノヒエ | 移植後15日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫50日前まで | 1,000mℓ<br>(70～100ℓ) | 本剤　2回以内<br>シハロホップブチル<br>3回以内<br>ベンタゾン<br>2回以内 | 落水散布<br>または<br>ごく浅く湛水<br>して散布 |
| 直播水稲 | 一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、<br>ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ | 播種後10日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫50日前まで | | | 乾田・落水状態で<br>雑草茎葉散布<br>または全面散布 |

■農林水産省登録:第19203号 ■有効成分:シハロホップブチル…3.0% ベンタゾン…20.0% ■性状:黄赤色澄明水溶性液体　除草剤分類 1, 6

### 【クリンチャー共通(抜粋)】

●広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在するほ場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。

●殺草特性から、とうもろこし、食用ひえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないでください。

### 【クリンチャーEW(抜粋)】

●本剤の使用の際は展着剤を加用してください。

●本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。

・周辺に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。

・散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。

### 【クリンチャーバスME液剤(抜粋)】

●処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用してください。

●高温など薬害を生じやすい条件での使用は多めの希釈水量を用い、低濃度液をなるべく水稲にかからないように散布してください。

### 【クリンチャーEW／クリンチャーバスME液剤(抜粋)】

●乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合があるので注意してください。特に乾田直播水稲に使用する場合は注意してください。

●使用前には、ラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。







販売: NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177　URL:https://www.nichino.co.jp/

製造: コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社



2025年8月作成版(CO)GL12508S