

無人航空機
散布に対応



殺虫剤

農林水産省登録
第21916号

®は日本農薬(株)の登録商標

フェニックス®

顆粒水和剤

効き目が長いから「安心」!!



アオムシ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



ハイマダラノメイガ

適用拡大!!

てんさい
(シロオビノメイガ)



写真はイメージです

野菜・果樹のチョウ目害虫防除に!

■2024年10月適用拡大		適用病害虫および使用方法			〈2024年10月現在の登録内容〉				
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数		
もも、ネクタリン	ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類	4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)		
おうとう	ハマキムシ類						2回以内		
小粒核果類(うめ、すももを除く)	ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)		
うめ	シンクイムシ類、ケムシ類						2回以内		
すもも	シンクイムシ類、ケムシ類	4000~6000倍					2回以内		
なし	ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)		
りんご	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、 ヨモギエダシャク、シンクイムシ類、ケムシ類	4000倍		収穫14日前まで 収穫7日前まで 収穫前日まで 収穫7日前まで	3回以内	散布	2回以内		
ぶどう	ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)		
かき	カキノヘタムシガ、イラガ類						2回以内		
かんきつ	ミカンハモグリガ、ハマキムシ類、ケムシ類、アゲハ類						3回以内		
キウイフルーツ	ハマキムシ類	32倍	3.2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内		
とうもろこし、ヤングコーン	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a				無人航空機による散布	2回以内	
飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ、オオタバコガ	32倍	3.2ℓ/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	2回以内		
そば	ハスモンヨトウ	2000~6000倍	100~300ℓ/10a				3回以内		
キャベツ	ヨトウムシ、オオタバコガ、アオムシ、コナガ、 ハスモンヨトウ、ウババ類	16倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内)		
		20倍	2ℓ/10a				3回以内		
		32倍	3.2ℓ/10a				3回以内		
メキャベツ	アオムシ、コナガ、ウババ類	2000倍	200ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内)		
はくさい	オオタバコガ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、 ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a				2回以内		
		20倍	2ℓ/10a				3回以内		
		32倍	3.2ℓ/10a	3回以内					
カリフラワー	コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内		
ブロッコリー	ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a				3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)		
		20倍	2ℓ/10a				2回以内		
		32倍	3.2ℓ/10a	2回以内					
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	コナガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内		
チンゲンサイ	コナガ、ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a				2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計2回以内)
レタス	ウババ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	20倍	2ℓ/10a						
		32倍	3.2ℓ/10a	2回以内					
		2000~4000倍	100~300ℓ/10a	2回以内					
非結球レタス	ウババ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	16倍	1.6ℓ/10a	2回以内	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内		
		20倍	2ℓ/10a						
		32倍	3.2ℓ/10a						
		2000~4000倍	100~300ℓ/10a						

→裏面にづく

