

難防除害虫に効く

# コテツ<sup>®</sup>フロアブル

® = BASF社の登録商標

- 登録作物が多い
- 幅広い害虫種に優れた効果
- 同時防除に最適

■ 適用害虫と使用方法

\* 本剤及びピクロルフェナビルを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍) または使用量	使用液量 (ℓ / 10a)	使用時期	使用*回数	使用方法
りんご	キンモンホソガ、ナミハダニ、ハマキムシ類、ミノガ類	2000	200~700	収穫前日まで	2回	散布
	ヨモギエダシャク、リンゴサビダニ	2000~4000				
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000				
	モモハモグリガ、カンザワハダニ、ナミハダニ、モモサビダニ、ウメシロカイガラムシ	2000				
ネクタリン	ミカンキイロアザミウマ	2000~4000				
	ナミハダニ、カンザワハダニ、チャノキイロアザミウマ、オウトウショウジョウバエ、ウメシロカイガラムシ	2000				
おうとう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ミカンキイロアザミウマ、ブドウサビダニ、ハマキムシ類	2000~4000				
	ナミハダニ、カンザワハダニ、ハスモンヨトウ、トビイロトラガ、モンキクロノメイガ、ミノガ類、コガネムシ類、ブドウハモグリダニ	2000				
ぶどう	ナミハダニ、カンザワハダニ	2000~4000				
	カキノヘタムシガ、イラガ類、アザミウマ類、カキサビダニ	2000~3000				
かき	ナミハダニ、カンザワハダニ、ニセナシサビダニ	2000				
	ヨモギエダシャク、チャノキイロアザミウマ	2000~4000				
なし	ヨモギエダシャク、ハスモンヨトウ、リュウキュウミカンサビダニ、カナタタキ、スグリソウムシ	2000				
	アザミウマ類(ネギアザミウマを除く)、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ	2000~6000				
かんきつ	ヒラスハナアザミウマ、カンザワハダニ、ショウジョウバエ類	2000				
いちじく	オウトウハダニ、ウメシロカイガラムシ、イラガ類	4000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
小粒核果類	キウイヒメヨコバイ、コガネムシ類					
キウイフルーツ	チャノキイロアザミウマ					
マンゴー	カンザワハダニ					
ゴレンシ	イラガ類、オウトウショウジョウバエ					
ブルーベリー	ハダニ類、ノメイガ類					
あずき	ハダニ類					
豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、美えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く)	ハダニ類、コフキソウムシ					
えだまめ	ハダニ類、アズキノメイガ					
さやいんげん	ハダニ類、ハスモンヨトウ					
実えんどう	ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、ハダニ類、ウリノメイガ、ウリハムシ					
さやえんどう	ミナミキイロアザミウマ、ハダニ類					
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ					
うり類(漬物用)	ハダニ類、オオタバコガ、ウリノメイガ					
すいか	ミナミキイロアザミウマ					
にがうり	オオタバコガ、ミカンキイロアザミウマ、ナミハダニ、トマトサビダニ、トマトキバガ					
かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ					
トマト	ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、チャノホコリダニ、ハダニ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、テントウムシダマシ類					
ミニトマト	ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、オオタバコガ、ハダニ類					
なす	ヒラスハナアザミウマ					
ピーマン	コナガ、アオムシ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ					
とうがらし類 (ししとうを除く)	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ					
ししとう	アオムシ					
キャベツ	コナガ					
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000	100~300	収穫3日前まで	2回	散布
茎ブロッコリー				収穫前日まで		
カリフラワー	コナガ					
ザイサイ	ハスモンヨトウ	2000	100~300	収穫3日前まで	2回	散布
しゅんぎく				収穫14日前まで		
メキャベツ	コナガ	2000	100~300	収穫7日前まで	2回	散布
非結球メキャベツ				収穫3日前まで		
コリアンダー(葉)	コナガ	2000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
やなぎたで				収穫14日前まで		
なばな類	コナガ	2000	100~300	収穫7日前まで	2回	散布
エンサイ				収穫3日前まで		
はくさい	コナガ					
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、チンゲンサイ、なばな類、非結球はくさい、非結球メキャベツを除く)	コナガ					
チンゲンサイ	アオムシ、コナガ					
非結球はくさい	アオムシ、コナガ、ハクサイダニ					
こまつな	アオムシ、コナガ、ダイコンサルハムシ					
だいこん						

適用害虫と使用方法

\*本剤及びクロルフェナピルを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

総合版

コテツフロアブル

有効成分：クロルフェナピル…1.0.0% 安全性：医薬用外劇物

殺虫剤分類 13

△ 効果・葉害等の注意

- 使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。
- ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、以下のことに注意してください。
  - ① 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
  - ② できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態にしてください。
- ボルドー液と混用する場合は凝集することがあるので、本剤を調整した後にボルドー液と混合してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないよう葉の裏面に十分に散布してください。
- きゅうり・なす・はくさい・だいこん・非結球あぶらな科葉菜類・なばなおよびセルリーの幼苗期に使用すると葉害を生じることがあるので注意してください。
- みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に入水しない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ピーマン・とうがらし類に使用する場合、品種により葉に褐点などの葉害を生じることがあるので、予備散布により葉害のないことを確認してから散布してください。
- かき(刀根早生など)の着色期の散布は葉害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- すいかに使用する場合、葉に葉害を生じることがありますが、その後の生育に対する影響は認められていません。
- igaりの幼苗期には葉害を生じるので、定植前には使用しないでください。定植後のigaりに使用する場合は、葉に灰褐色などの斑点の葉害を生じることがあるので、予備散布により葉害のないことを確認してから散布してください。
- 西洋かぼちゃ(黒皮栗・青皮栗・えびす・雪化粧・みやこ・黒皮甘栗・栗味・栗マロン・芳香等)には葉害を生じるおそれがあるので、使用しないでください。
- ほうれんそうに使用する場合、葉に白化などの葉害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守って使用してください。
- ばら・食用ミニバラに本剤を初めて使用する場合は、事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。
- カーネーションへの散布は葉害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- シクラメンに使用する場合、新葉に葉害を生じる場合があるので、葉害の出ないことを事前確認してから散布してください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、灌水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 周辺の作物にかかる葉害を生じる場合があるので、かからないよう十分注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
  - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
  - マルハナバチに対して影響があるので注意してください。
  - 本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意してください。
    - ① 散布機種の散布基準に従って実施してください。
    - ② 散布機種に適合した散布装置を使用してください。
    - ③ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
    - ④ 散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  - ⑤ 散布終了後は以下の注意事項を守ってください。
    - ・ 使用後の空容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
    - ・ 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。
    - ・ 散布終了後、機体の装置は十分洗浄してください。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

△ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布等の作業の際は、防護マスク・手袋・不浸透性防汚衣などを着用してください。作業後は手足・顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 街道、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないう網囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 直射日光をさけ、鏡のかかるなるべく低温場所に密栓して保管してください。

※この資料は2026年1月現在の知見に基づき作成したものです。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	使用回数	使用方法
かぶ	コナガ、ナモグリバエ、ヨトウムシ	2000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
みょうが(花穂)	ハダニ類			収穫前日まで		
みょうが(莖葉)	ハダニ類			*2花穂の収穫前日まで		
いちご	ハダニ類、ハスモンヨトウ、シクラメンホコリダニ、ミカンキイロアザミウマ			収穫前日まで		
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類、ネギハモグリバエ、ネギコガ			収穫7日前まで		
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ			収穫前日まで		
レタス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、ヨトウムシ			収穫前日まで		
モロヘイヤ	アザミウマ類			収穫7日前まで		
あしたば	ウドノメイガ			収穫前日まで		
やまのいも	カンザワハダニ、ナガイモコガ			収穫3日前まで		
やまのいも(むかご)	ハスモンヨトウ、ハダニ類	2000~4000	1.6	収穫前日まで	1回	散布
かんしょ	ヨツモンカメノコハムシ、シロイチモジヨトウ					
かんしょ	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	*4散布	
はすいも(葉柄)	カンザワハダニ、ハスモンヨトウ	2000	100~300	収穫7日前まで	2回	散布
さといも	ハダニ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、					
さといも(葉柄)	ハダニ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、	100~500	3.2	収穫前日まで	2回	*4散布
アスパラガス	シロイチモジヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類、ヨトウムシ	2000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
ふき	ハスモンヨトウ、ハダニ類					
ふき(ふきのとう)	ヨトウムシ、ハダニ類、カメノコハムシ					
てんさい	ヨトウムシ					
セルリー	ヨトウムシ					
にんじん	ヨトウムシ、キアゲハ、ヒョウタンゾウムシ類					
みつば	ヨトウムシ					
みしまさいこ	ヨトウムシ					
つるむらさき	ヨトウムシ					
しょうが	ヨトウムシ					
葉ごぼろ	ハダニ類、ヨトウムシ	2000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
すいぜんじな	ハダニ類、ヨトウムシ					
よもぎ	ミナミキイロアザミウマ					
葉にんにく	ハダニ類					
とわぶき	ハダニ類					
せんきゅう	ハダニ類					
たらのき	ハダニ類					
はまぼうふう(葉)	ハダニ類					
うど	シクラメンホコリダニ					
ほうれんそう	ホウレンソウケナガコナダニ			4000~6000		
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	4000	200~700	収穫7日前まで	2回	散布
とうもろこし	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	2000	100~300	収穫前日まで	2回	散布
ヤングコーン	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
飼料用とうもろこし(子実)	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用プリムラ	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ類、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ					
食用金魚草	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用なでしこ	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用エキザカム	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用せんにちこう	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用トレニア	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用パンジー	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
食用ミニバラ	ハダニ類、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ					
なんてん(葉)	アザミウマ類	2000	200~400	収穫前日まで	2回	散布
茶	アザミウマ類					
食用ぎく	アザミウマ類					
きく(葉)	アザミウマ類					
きく	アザミウマ類					
ストック	アザミウマ類					
花き類・観葉植物(きく、ストックを除く)	アザミウマ類					
しきみ	アザミウマ類					
アザレア	アザミウマ類					
みか	アザミウマ類					
ぶどう	アザミウマ類					

- \*1 花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する
- \*2 花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで \*3 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで
- \*4 無人航空機による散布 \*5 使用量

水産動植物(魚類・甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- ★ 使用前にはラベルをよく読んでください。 ★ ラベルの記載以外には使用しないでください。 ★ 小児の手の届くところには置かないでください。
- ★ 使用後の空容器等は固場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ★ 防除日誌を記帳しましょう。

LINE公式アカウントをはじめました!

友だち募集中 最新情報をLINEで配信!

@nichino

詳細やSDSはWEBでご覧いただけます

販売: NICHINO 東京都中央区 京橋1丁目 日本農薬株式会社 19番8号 TEL: 0570-09-1177 URL: https://www.nichino.co.jp/

製造: BASFジャパン株式会社

2026年2月作成版(SZ)KG12602S