

殺虫剤

農林水産省登録  
第22662号

# アプロード<sup>®</sup> スタークル<sup>®</sup> ザル



ウシカ、カメムシ、ツマグロヨコバイを  
省力的に同時防除！



ツマグロヨコバイ



ミナミアオカメムシ



トビイロウンカ



〈内容量100mL〉

®アプロードは日本農薬(株)の登録商標  
®スタークルは登録商標



NICHINO

日本農薬株式会社



# 殺虫剤 アプロードスタークル<sup>®</sup>バル

有効成分：プロフェジン……18.0%  
ジノテフラン……9.0%

殺虫剤分類 4A,16

安全性：普通物  
(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

## 特長

- ①ウンカ類に定評のアプロード、カメムシ類に優れた効果のスタークルを配合した水稻用殺虫剤です。
- ②トビイロウンカには、アプロードの残効性とスタークルの優れた効果で、処理適期幅が広く長期間安定した効果が持続します。
- ③カメムシ類には、スタークルの殺虫効果と吸汁阻害効果で斑点米被害を阻止します。


## 適用病害虫および使用方法

(2023年4月現在の登録内容)

| 作物名 | 適用病害虫名                    | 希釈倍数  | 使用液量            | 使用時期        | 本剤の使用回数 | 使用方法              | ジノテフランを含む農薬の総使用回数                                                      | プロフェジンを含む農薬の総使用回数        |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|-------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 稲   | ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>カメムシ類 | 1000倍 | 60~150ℓ<br>/10a | 収穫7日前<br>まで | 3回以内    | 散布                | 4回以内<br>育苗箱への処理及び<br>側条施用は合計1回以内、<br>本田での散布、<br>空中散布、無人ヘリ散布は<br>合計3回以内 | 4回以内<br>(小包装投入は<br>1回以内) |
|     |                           | 8倍    | 0.8ℓ<br>/10a    |             |         | 無人ヘリコプター<br>による散布 |                                                                        |                          |


## 試験成績

### ■セジロウンカ



試験場所：日本農薬(株)  
総合研究所(2008年)  
品 種：日本晴  
発生状況：少発生  
移 植：6/12  
出 穂：8/14  
処 理：7/31(幼穂分化期)  
調 査：7/31(処理前)、  
8/7(処理7日後)、  
8/14(処理14日後)

### ■カメムシ類



試験場所：(社)福井県植物防疫協会(2008年)  
品 種：ハナエチゼン  
発生状況：少発生  
優 占 種：ホソハリカメムシ、  
アカヒゲホソドリカスミカメ、  
アカスジカスミカメ  
5/2  
移 植：7/22  
出 穂：7/26(穂揃期)、  
処 理：8/6(穂熟期)  
調 査：8/26

## 注意事項

- 使用の際は薬液をよく攪拌して均一な状態にして使用してください。また、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - ①散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
  - ②散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - ③微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
  - ④散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ⑤散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ⑥散布薬液の飛散によって動植物および自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  - ⑦散布終了後は次の事項を守ってください。
    - a 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
    - b 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
  - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区  
京橋1丁目  
19番8号

2023年6月作成版(Z) D012306S