

適用拡大

アスパラガス
(ハダニ類)

●ミカンキイロアザミウマ



ミカンキイロアザミウマをはじめ 主要害虫を同時防除



●ハスモンヨトウ



●オオタバコガ



●オンシツコナジラミ



●アブラムシ類




●ハダニ類

ミツバチ・マルハナバチにやさしい

農林水産省登録第18955号

日農

アージェント® 水和剤



NICHINO

日本農薬株式会社

特長

- 難防除害虫であるミカンキイロアザミウマに対し、優れた効果を示します。
- ハダニ類やアブラムシ類等、野菜・花き類の主要害虫に優れた効果を示し、同時防除が期待できます。
- ミツバチ、マルハナバチに影響を与える期間が比較的短く、使いやすい薬剤です。
- 気温の高低に関係なく、安定した効果を示します。

適用病害虫および使用方法(抜粋)

2022年8月適用拡大

(2022年8月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクリナトリンを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	オンシツコナジラミ ミカンキイロアザミウマ	1000倍	150~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内		
すいか	ハダニ類 アブラムシ類								
メロン	ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ	750倍						5回以内	5回以内
トマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ	1000倍						3回以内	3回以内
ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ							2回以内	2回以内
ピーマン	アブラムシ類 ハダニ類							4回以内	4回以内
とうがらし類	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ							2回以内	2回以内
いちご	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ							4回以内	4回以内
なす	ハスモンヨトウ							2回以内	2回以内
アスパラガス	アブラムシ類 カメムシ類 オオタバコガ ハダニ類							150~500ℓ/10a	2回以内
パセリ	ネギアザミウマ	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ カンザワハダニ ヨモギエダシャク	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	5回以内	5回以内				
きく	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	150~300ℓ/10a	発生初期	1回	1回				
食用ぎく	ハスモンヨトウ ヨトウムシ		発生初期 ただし、 収穫14日前まで	1回	1回				

(詳しくは製品ラベルをご確認ください)

上手な使い方

- なるべく害虫の発生初期に散布してください。
- 本剤には浸透移行性はありません。十分な効果を得るために、十分量を葉裏までていねいに散布してください。
- ピレスロイド系殺虫剤の連用は害虫の抵抗性を発達させる恐れがあるので、さけてください。
- きくに使用する場合、開花後の散布は汚れを生ずる恐れがあるので、さけてください。

⚠ 使用上の注意事項

- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、本剤の連続使用は避け、作用性の異なる他の殺ダニ剤と輪番で使用してください。また、本剤の年間使用回数もできるだけ少なくするよう努めてください。
- 蚕に対しては長期間毒性があるので、近くに桑園のある場合には絶対にかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避けてください。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- 散布直後から2日後まではミツバチを移動させるか、巣門を閉じてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- のど、鼻、皮膚等を刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 散布液調整時及び散布の際には保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。
- 摘果等の作業の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所へは置かないでください。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

2023年6月作成版(2)DD12306S