ロイヤント™乳剤

Rinskor™active

水稲用除草剤

農林水産省登録：第24387号

水田畦畔の雑草防除

水田畦畔に適用拡大！
田んぼの中も畦畔も。

- 稲への飛散薬害の心配なく畦畔の広葉雑草を防除できます。
- 水田内と同時に畦畔の除草ができます。

■各種雑草効果確認事例

タカサブロウ（20cm）


ヒメジョオン（70cm）


ヒメムカシヨモギ（65cm）

オオアレチノギク（25cm）

カラスノエンドウ（29cm）

ツユクサ（28cm）

エノキグサ（8cm）

アメリカフウロ（14cm）

イヌタデ（18cm）

ヤエムグラ（39cm）

ヨモギ（30cm）

アレチヌスビトハギ（32cm）

クズ（40cm）


スギナ（33cm）

ヤブガラシ（95cm）

■適用雑草と使用方法

2025年7月現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アールあたり使用量	本剤の使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェンベンジルを含む総使用回数
移植水稲	―	一年生広葉雑草及びノビエ、マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ	移植後20日～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200mℓ 希釈水量：25～100ℓ	2回以内	落水散布、ごく浅く湛水して散布又は湛水散布	3回以内
		アゼガヤ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、ナガエツルノゲイトウ				落水散布又はごく浅く湛水して散布	
直播水稲		一年生広葉雑草及びノビエ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ	稲3葉期～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200mℓ 希釈水量：100ℓ		乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布	
水稲（水田畦畔）	水田畦畔	一年生及び多年生広葉雑草	収穫45日前まで（雑草生育期）	薬量：200mℓ 希釈水量：25～100ℓ		雑草茎葉散布	2回以内

- 畦畔のイネ科雑草には効果が期待できません。
- 土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されない場合があります。

ロイヤント乳剤について➡
もっと詳しくはこちら

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

2025年10月作成版（CO）IU12510S