

ロイヤント™ 乳剤

Rinskor™ active

水稲用除草剤

農林水産省登録：第24387号

水田畦畔の雑草防除

水田畦畔に適用拡大！ 田んぼの中も畦畔も。

- 稲への飛散薬害の心配なく畦畔の広葉雑草を防除できます。
- 水田内と同時に畦畔の除草ができます。




■各種雑草効果確認事例



タカサブロウ (20cm)



ヒメジョオン (70cm)



ヒメムカシヨモギ (65cm)



オオアレチノギク (25cm)



カラスノエンドウ (29cm)




ツククサ (28cm)



エノキグサ (8cm)



アメリカフウロ (14cm)



イヌタデ (18cm)



ヤエムグラ (39cm)




ヨモギ (30cm)



アレチヌスビトハギ (32cm)



クズ (40cm)



スギナ (33cm)



ヤブガラシ (95cm)

■適用雑草と使用方法

2023年3月現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アールあたり 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェンベンジルを含む総使用回数
移植水稲	—	一年生広葉雑草及び ノビエ、マツバイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200ml 希釈水量：25～100ℓ	2回以内	落水散布、 ごく浅く湛水して 散布又は湛水散布	3回以内
		アゼガヤ、オモダカ、 エゾノサヤヌカグサ、シズイ、 ナガエツルノゲイトウ				落水散布又は ごく浅く湛水して 散布	
直播水稲	—	一年生広葉雑草及び ノビエ、ミズガヤツリ、 ウリカワ、セリ	稲3葉期～ノビエ5葉期 但し、収穫45日前まで	薬量：200ml 希釈水量：100ℓ	2回以内	乾田・落水状態で 雑草茎葉散布 又は全面散布	2回以内
水稲 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生及び 多年生広葉雑草	収穫45日前まで (雑草生育期)	薬量：200ml 希釈水量：25～100ℓ		雑草茎葉散布	

- 畦畔のイネ科雑草には効果が期待できません。
- 土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されない場合があります。



←ロイヤント乳剤について
もっと詳しくはこちら



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414

ホームページアドレス <https://www.nichino.co.jp/>



CORTEVA
agriscience

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

2023年4月作成版 (CO)IU12304S