インダー™フロアブル

園芸用殺菌剤

❶ 予防効果と治療効果

予防に加え治療効果に優れ、初期感染時の散布でも病斑の進展を防ぎます。

❷ 炭疽病に優れた効果

お茶の重要病害の炭疽病に高い治療効果を示します。

❸ 摘採7日前まで使える

低濃度で散布でき、薬液による作物への汚れがほとんどありません。

EUへ輸出するお茶に使用できるようになりました！

フェンブコナゾール（商品名：インダーフロアブル）のEUの「茶」における残留農薬基準値（インポートトレランス）が30mg/kgに変更されたことにより、**日本の農林水産省登録濃度による使用でもEU向け輸出が可能になりました。**米国・台湾・香港の「茶」へも残留農薬基準値が設定されています。

日本	US	EU	台湾	香港
30	30	30	5	10

（2025年8月時点）

「茶」の病害防除には インダーフロアブル。

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

インダー™フロアブル

園芸用殺菌剤

■農林水産省登録：第20616号
■有効成分：フェンブコナゾール･･･22.0%
■性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

殺菌剤分類 3

●適用病害虫および使用方法（抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 褐色円星病	5000～8000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	もち病 網もち病	5000倍					

●茶病害の発生消長と防除適期



●使用上のポイント

◎炭疽病は、5月～10月の長期にわたり発生する病気で、病原菌は茶樹上に残った被害葉上で越冬します。このため、最終摘採後の新芽における防除は、翌春の発生源（＝被害葉）を作らないためにも、極めて重要です。

◎インダーフロアブルは炭疽病に高い治療効果を示し、感染後の2～3葉期の散布でも優れた効果が得られます。

◎インダーフロアブルは残効性にも優れ、併せて防除が必要なもち病、網もち病、褐色円星病（緑斑症）にも高い効果があります。

このように薄めればいインダー

●インダーフロアブルの希釈早見表（必要な薬量）

希釈倍数＼希釈水量	300ℓ	500ℓ	600ℓ	1,000ℓ
5,000倍	60mℓ	100mℓ	120mℓ	200mℓ
8,000倍	37.5mℓ	62.5mℓ	75mℓ	125mℓ

⚠ 使用上の注意

- 貯蔵中に分離することがあるので、使用に際してはよく振ってください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤飲の場合には、吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 散布の際は、保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 密栓し、食品と区別して、直射日光を避け、なるべく低温な場所に保管してください。

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年8月現在の知見に基づき、作成されています。

LINE公式アカウントはじめました！
友だち募集中
最新情報をLINEで配信！
@nichino

販売：NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋１丁目１９番８号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

製造：コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2025年10月作成版（CO）HE12510S