


# 水稻用殺虫剤

# オーケストラ スタークル<sup>®</sup>エア<sup>®</sup>



無人航空機  
防除に!



響け! ウンカ類、カメムシ類から  
水稻を守るハーモニー



新しい作用性を  
動画で紹介!

新しい  
作用性

で、既存剤抵抗性ウンカ類も強力防除! スタークルの効果で斑点米被害を阻止!



トビロウンカ



ヒメトビウンカ



セジロウンカ



ミナミアオカメムシ



クモヘリカメムシ



NICHINO

日本農薬株式会社

※オーケストラスタークルエア<sup>®</sup>は、  
「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載。

® オーケストラは日本農薬(株)の登録商標。  
® スタークルは登録商標。

水稲用殺虫剤

# オーケストラスタークェア<sup>®</sup>

有効成分: ジノテフラン…9.0% ベンズピリモキサン…10.0% 安全性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

♪  
特  
長  
♪

- ① ♪ ウンカ類に高い効果を示すオーケストラ、カメムシ類に優れた効果のスタークルを配合した水稲用殺虫剤です。
- ② ♪ オーケストラは、新規作用性を有し、既存剤に抵抗性が発達したウンカ類に有効です。
- ③ ♪ スタークルは、カメムシ類に対して殺虫効果と吸汁阻害効果があり、斑点米被害を阻止します。




## ♪適用病害虫および使用方法♪

(2024年4月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ベンズピリモキサンを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類	1000倍	60~150ℓ / 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布 無人航空機による散布	4回以内 育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内	3回以内
	カメムシ類	8倍	0.8ℓ / 10a					


## ♪試験成績♪

### トビイロウンカ



- (一社)日本植物防疫協会 宮崎試験場(2017年) ●品種: ヒノヒカリ
- 発生状況: 中発生
- 処理量: 120ℓ / 10a ●処理日: 8月16日(幼穂形成期)
- 調査日: 8月16日、21日、25日、29日 ●調査方法: 1区20株×3ヵ所 払い落とし法

### カメムシ類



- (一社)日本植物防疫協会 宮崎試験場(2017年) ●品種: コシヒカリ
- 発生状況: ミナミアオカメムシ: 中→少発生(放虫)、シラホシカメムシ: 少発生
- 処理量: 133ℓ / 10a ●処理日: 7月15日(乳熟~糊熟期)
- 調査日: 7月31日(散布16日後)
- 調査方法: 各区中央部の10株を刈り取り、乾燥後に4,000粒(1,000粒×4反復)の斑点米数を計数

## 注意事項

- 使用の際は、薬液をよく攪拌して均一な状態にして使用してください。また、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - ① 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
  - ② 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - ③ 散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
  - ④ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ⑤ 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装やカラートンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  - ⑥ 散布終了後は次の事項を守ってください。
    - a. 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
    - b. 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 無人航空機による散布で使用の場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所に置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



# NICHINO

## 日本農薬株式会社

東京都中央区 京橋1丁目 19番8号

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>

2024年4月作成版(KE)FS12404S