

ゾーベック™ エンカンティア™ SE

園芸用殺菌剤

豊かな実りにつながる新しい効き目。

2種類の有効成分で疫病・べと病と闘う!

- 2種の有効成分のはたらきで、疫病・べと病に安定した効果
- 従来の薬剤に対して感受性の低下した疫病菌・べと病菌にも有効
- 浸透移行性があるため新葉も守る
- 耐雨性に優れる
- 病原菌生活環の全ステージで優れた効果

ばれいしょの
夏疫病に
適用拡大!



さあ、
新しい次元へ。

疫病・ベと病に対するゆとりの防除効果


疫病菌・ベと病菌に対する基礎活性が高く、また病原菌生活環における様々なステージに作用します。そのため、病気の発生しやすい条件の中でも安定して優れた防除効果を発揮します。また、感染前の予防的な散布が基本ですが、悪天候(荒天、連続的な降雨など)や他の管理作業のためやむをえず最適な防除タイミングを逃してしまった場合でも比較的の安定した効果が期待できます。

■適用病害と使用方法

2024年5月現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数	ファモキサドンを含む農薬の総使用回数		
ばれいしょ	夏疫病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内		
	疫病									
		500倍	25ℓ/10a			無人航空機による散布				
		32倍	1.6ℓ/10a							
レタス		64倍	3.2ℓ/10a							
	ベと病	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内		
				収穫14日前まで				3回以内		

■推奨する使用時期(ばれいしょ)



開花までの栄養成長期には次々と新しい葉が伸びてくるため、殺菌剤のかかっていない新葉部分から疫病に感染することがあります。この時期には、新葉まで保護できるゾーベック™が適しています。生育期の前半にしっかりと予防除をしておくと、圃場全体の菌密度が下がり、後半の防除がしやすくなります。また、臨機防除の必要性を下げることにもつながります。

■効果・薬害等の注意

- 使用前によく振って、薬液が十分懸濁されていることを確認してから使用してください。● 使用量に合わせて薬液を調整し、使いきってください。● アルカリ性農薬との混用はさけてください。● 敷設液調製後はできるだけ速やかに散布してください。● 使用液量は、対象作物の生育段階・栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。● 敷設にあたっては、風向きなどに注意し、薬液が周辺の作物に飛散してからないように十分注意してください。● 適度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。● 耐性菌管理の観点から、育苗期間中は本剤を使用しないでください。● ばれいしょに対して希釈倍数500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度運動式地上液剤散布装置を使用してください。● 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。①散布は各散布機種の散布基準にしたがって実施してください。②散布機種に適合した散布装置を使用してください。③散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。④散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。● 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。● 敷設の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足・顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。● 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。● かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。● 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。● 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。● 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

■有効成分ゾーベック 耐性菌管理方針

殺菌剤分類 49, 11

- 疫病、ベと病に有効異なる作用性の殺菌剤と組み合せた体系(ローテーション散布)で使用してください。
- 殺菌剤分類(FRACコード)49の有効成分を含む薬剤(本剤を含む)の使用回数は終防除回数の1/3を超えないようにしてください(疫病、ベと病の防除が3回以内であれば1回まで)。
- 本剤は病気が発生する前に、予防的に散布してください。病気発生後の散布では十分な効果が得られません。また耐性菌の発生を助長する恐れがあります。
- 本剤は栽培期間の前に使用してください。有効成分による作物保護効果が高く発揮されるだけでなく、耐性菌発生のリスクが抑えられます。
- 殺菌剤分類(FRACコード)49の有効成分を含む薬剤(本剤を含む)は定植前の苗には使用しないでください。

Corteva AgriscienceはFRACメンバーでの活動を全面的に支持しており、前記のゾーベックエンカンティア耐性菌管理方針は上述した考え方方に則って作成されています。
FRACに関する参照サイト

- (1) Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) ウェブサイト(英語)
<http://www.frac.info/home>
- (2) Japan FRAC 殺菌剤耐性菌対策委員会 ウェブサイト(日本語)
<http://www.jcpa.or.jp/lab/jfrac/>

● ラベルをよく読んでください。 ● 記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。

● 空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ● 防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2024年5月現在の知見に基づき、作成されています。



販売:  **NICHINO**
日本農薬株式会社
TEL:0570-09-1177 URL:<https://www.nichino.co.jp/>

製造: コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2024年5月作成版(CO)GV12405S