

殺菌剤

モンカットプラス[®] フロアブル



種いも消毒の新定番!!

●従来の防除に安心を **+** プラス!!
●ばれいしょのそうか病・黒あざ病に
優れた効果を発揮!!



そうか病



黒あざ病(塊茎)



黒あざ病(萌芽期)



含有はイタリシです



NICHINO

日本農薬株式会社

殺菌剤

ばれいしょ版

モンカットプラス フロアブル

有効成分 フルジオキシニル……………7.3%
フルトラニル……………18.2%
殺菌剤分類 **12.7**

安全性 普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特
長

1 黒あざ病防除の定番であるフルトラニルと、そうか病に高い効果を示すフルジオキシニルの混合殺菌剤です。

2 2つの有効成分により、黒あざ病に加え問題病害であるそうか病に対しても有効です。

3 フロアブル製剤なので秤量が簡単で、混合剤であるため混用に係る面倒な作業も軽減されます。

適用病害虫および使用方法 (抜粋)


〈2025年6月現在の適用内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む 農薬の総使用回数	フルトラニルを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	そうか病	100～200倍	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬	1回	1回
			種いも100kg 当り3ℓ			種いも散布		
	黒あざ病	20倍	—			種いも瞬間浸漬		
			種いも100kg 当り3ℓ			種いも散布		
			種いも100kg 当り200～300ml					

試験成績

そうか病

北海道農業研究センター(2021年)




●品種：しんせい ●発生状況：甚発生(汚染種いもを使用・発病度1～2)
●処理日：5月10日(瞬間浸漬後、一晚風乾) ●調査日：9月24日

黒あざ病

■ 幼茎 ■ ストロン

北海道植物防疫協会(2020年)



●品種：男爵薯 ●発生状況：〈幼茎〉甚発生、〈ストロン〉甚発生(菌核付着種いもを使用)
●処理日：4月30日 ●調査日：〈幼茎〉6月12日、〈ストロン〉7月10日

注
意
事
項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 所定濃度の薬液で種いも浸漬又は散布し、風乾後植付けてください。
- 種いも浸漬の際は不浸透性手袋などを着用してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

LINE公式アカウントはじめました!

友だち募集中 最新情報をLINEで配信!

QRコード: @nichino



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

2025年6月作成版(Z) H12506S