

インダー™フロアブル



園芸用殺菌剤

① 予防効果と治療効果

予防に加え治療効果に優れ、初期感染時の散布でも病斑の進展を防ぎます。

② 4病害に適用

黒とう病、灰色かび病、うどんこ病、褐斑病に優れた効果を発揮します。

③ 果実汚れが少ない

低濃度で散布でき、薬液による作物への汚れがほとんどありません。



「ぶどう」の病害防除には
インダーフロアブル。

園芸用殺菌剤

●適用病害と使用方法(抜粋)


*本剤およびフェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数*	使用方法			
ぶどう	黒とう病、うどんこ病 灰色かび病、褐斑病	8,000	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布			
りんご	赤星病	8,000~12,000	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布			
	黒星病、うどんこ病	5,000~12,000							
	モニリア病	5,000							
	褐斑病、黒点病 すす点病、すす斑病	10,000							
なし	黒星病	5,000~12,000							
	赤星病	8,000~12,000							
	輪紋病	5,000							
	うどんこ病	5,000~10,000							
かき	炭そ病、うどんこ病、落葉病	5,000		200~300ℓ/10a			発病初期	5回以内	散布
もも	灰星病、黒星病								
ネクタリン									
すもも	灰星病								
あんず									
おうとう	灰星病、幼果菌核病								
うめ	黒星病、すす斑病								
ブルーベリー	灰色かび病		8,000						
りんどう	花腐菌核病、葉枯病		5,000						

◎上記作物の他に茶にも適用があります。

詳しくは製品ラベルをご確認ください

■インダーフロアブル対象病害の感染時期(模式図)と散布適期例



インダーフロアブル散布適期例 ※薬剤耐性菌対策のため、連用は避け、異なる系統の薬剤と輪番使用しましょう。

■インダーフロアブルの希釈早見表(必要な薬量)

希釈倍数	希釈水量	300ℓ	500ℓ	600ℓ	1,000ℓ
5,000倍	60mℓ	100mℓ	120mℓ	200mℓ	
8,000倍	37.5mℓ	62.5mℓ	75mℓ	125mℓ	
10,000倍	30mℓ	50mℓ	60mℓ	100mℓ	
12,000倍	25mℓ	42mℓ	50mℓ	83mℓ	

- 幅広い果樹に使える!
- 低濃度でよく効く!
- 優れた予防効果と治療効果!

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2022年11月現在の知見に基づき、作成されています。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!

レイミー

日農ホームページ

⚠ 使用上の注意

- ・貯蔵中に分離することがあるので、使用に際してはよく振ってください。
- ・使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- ・誤飲に注意してください。誤飲の場合には、吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせてください。
- ・散布の際は、保護メガネ、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ・密栓し、食品と区別して、直射日光を避け、なるべく低温な場所に保管してください。

販売: **日本農薬株式会社**
 東京都中央区京橋1丁目19番8号
 カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414
 ホームページアドレス <https://www.nichino.co.jp/>

製造: コルテバ・ジャパン株式会社