

水田に侵入した ナガエツルノゲイトウに 有効成分リンズコア™が効く!



茎葉散布用

ロイヤント™ 乳剤


Rinskor™ active

水稲用除草剤

- 60cmまでのナガエツルノゲイトウを枯殺
- 水田畦畔にも使用可能
- すばやい効果発現
- 散布2時間後の雨でも効果を発揮



■ナガエツルノゲイトウに対する効果



●2021年 農研機構(千葉県) ●移植:4月27日 ●処理:5月3日 A剤、6月7日 B剤・ロイヤント乳剤 ●調査:7月5日に㎡あたり乾物重を調査

■ナガエツルノゲイトウの防除事例

ロイヤント乳剤 処理11日後



湛水散布用

ウィードコア™ 1キロ粒剤


Rinskor™ active

水稲用除草剤

- 15cmまでのナガエツルノゲイトウを枯殺できる中後期除草剤
- 4葉期までのノビエや大きな広葉雑草に優れた効果
- すばやい効果発現
- 初期剤との体系処理を推奨



■ナガエツルノゲイトウに対する効果




●2021年 農研機構(千葉県) ●移植:4月27日 ●処理:5月3日 C剤、5月10日 ウィードコア1キロ粒剤(単用)、5月18日 ウィードコア1キロ粒剤(体系) ●調査:7月5日に㎡あたり乾物重を調査

■ナガエツルノゲイトウの防除事例

処理前



ウィードコア1キロ粒剤 処理5日後



ロイヤント™ 乳剤

Rinskor™ active

リンズコアの
様々な情報は
こちらから →



■登録番号：第24387号
■有効成分：フロルピラウキシフェンベンジル (通称:リンズコア)・・・2.7%
■規格：200mℓ×20本、1ℓ×12本
■危険物：第4類第三石油類

除草剤分類 4

水稲用除草剤

■適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アールあたり使用量	本剤の使用回数	使用方法	フロルピラウキシフェンベンジルを含む総使用回数
移植水稲	—	一年生広葉雑草 ノビエ、マツバイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ	移植後20日～ ノビエ5葉期 ただし、収穫45日前まで	薬量：200mℓ 希釈水量：25～100ℓ	2回以内	落水散布、 ごく浅く湛水して 散布又は湛水散布	3回以内
		落水散布又は ごく浅く湛水して 散布					
直播水稲	—	一年生広葉雑草 ノビエ、ミズガヤツリ、 ウリカワ、セリ	稲3葉期～ノビエ5葉期 ただし、収穫45日前まで	薬量：200mℓ 希釈水量：100ℓ	乾田・落水状態で 雑草茎葉散布 又は全面散布		
水稲 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生及び 多年生広葉雑草	収穫45日前まで (雑草生育期)	薬量：200mℓ 希釈水量：25～100ℓ		雑草茎葉散布	2回以内

⚠ 使用上の注意 (抜粋)

- ホタルイ、クログワイ、コウキヤガラには効果が低いので、それら雑草が混在する場合はそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。
- 土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されないことがあります。乾田または落水状態で散布する際は早め(3日以内)に入水してください。
- 葉害のおそれがあるので重複散布をさけてください。
- 葉害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意してください。
- 幼穂形成期以降の散布では葉先の黄化や止葉の下垂が見られる場合がありますが、収量に対する影響は認められていません。
- 散布機、ホース、ノズル、タンク等の器具は、使用後速やかに十分に洗浄し、洗浄液は河川等に流さず、環境に影響をあたえないように適切に処理してください。

ウィードコア™ 1キロ粒剤

Rinskor™ active

■登録番号：第24389号
■有効成分：フロルピラウキシフェンベンジル (通称:リンズコア)・・・0.40%
ペノキスラム・・・0.50%
ベンゾピシクロン・・・2.0%
■規格：1kg x 12袋

除草剤分類 4, 2, 27

水稲用除草剤

■適用雑草と使用方法

※作物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数を示します。

作物名	適用雑草名	使用時期	10アールあたり使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	一年生雑草 キシウスズメノヒエ 多年生広葉雑草	移植後7日～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで	1kg	本剤：2回以内	湛水散布又は 無人航空機による散布
直播水稲	一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、セリ、 ヒルムシロ	稲3葉期～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで		フロルピラウキシフェンベンジル：3回以内 ペノキスラム：2回以内 ベンゾピシクロン：3回以内	

⚠ 使用上の注意 (抜粋)

- 雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように散布してください。
- 散布に当たっては、水深3～5cmの湛水状態で田面に均一に散布してください。水の出入りを止めて、少なくとも3～5日間はそのままの湛水状態を保ち、田面を露出させないように注意してください。散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。

- 使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2023年11月現在の知見に基づき、作成されています。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



販売: **NICHINO** 東京都中央区
日本橋1丁目
19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

製造: コルテバ・ジャパン株式会社

2023年12月作成版(CO)JC12312S