トランスフォーム™ フロアブル

Isoclast™active

園芸用殺虫剤

速効性と残効性で「ほうれんそう」をアブラムシから守りぬく！

しつこいアブラムシ類をしっかり防除！

ほうれんそうに適用拡大！

収穫3日前まで、2回ご使用いただけます。

■ストレッチ症状（ワタアブラムシ）

2次元コード：動画でもご覧いただけます。

■適用害虫と使用方法（ほうれんそう抜粋）

■農林水産省登録：第24016号

殺虫剤分類 4C

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	10アール当り使用液量	使用時期	本剤およびスルホキサフロルを含む農薬の総使用回数	使用方法
ほうれんそう	アブラムシ類	2,000	100 ～ 300ℓ	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布

■ワタアブラムシに対する効果試験

（ほうれんそう）　2016年　長野県野菜花き試験場



【試験概要】 ●発生状況:多発生 ●品種：アクティブ（定植4月18日） ●試験区:1区300株3連制 ●散布：5月24日に背負式動噴を用いて300L/10aを散布した（展着剤無加用）。 ●調査：あらかじめマークした10株全葉について散布直前（5月24日）、散布3日後（5月27日）、散布7日後（5月31日）、散布15日後（6月8日）に有翅および無翅の寄生虫数を調査した（グラフは有翅虫と無翅数の合計）

考察：トランスフォームフロアブルは処理後15日までワタアブラムシの増殖を抑制した。

■トランスフォームフロアブルの速効性

（ブロッコリー／モモアカアブラムシ）　2015年　日産化学株式会社



【試験概要】 ブロッコリー苗に寄生したモモアカアブラムシに薬液を処理し、各処理後経過時間における落下虫数を調査した。

考察：トランスフォームフロアブルは処理3時間後には90%以上の寄生虫を落下させた。

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

2025年10月作成（CO）HX12510S