ファルコン™フロアブル

園芸用殺虫剤

ファルコンフロアブルは、チョウ目害虫に
脱皮促進作用を示し、すぐれた速効性を発揮します。

❶ 脱皮促進作用　2～3日後には致死。

本剤は幼虫の脱皮を急激に促進させます。
幼虫は成長が追いつかず脱皮失敗で死亡します。

❷ 食害防止作用　10数時間後にはストップ。

成分が体内に入ると、幼虫の生理状態は
脱皮間近の状態に変わり食害が止まります。

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

■適用害虫と使用方法

処理方法：散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	10アール当り使用液量（ℓ）	使用時期※	総使用回数※
キャベツ	コナガ	1,000	150～300	7日	2回
	アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	2,000～4,000			
	オオタバコガ	2,000			
	ハイマダラノメイガ	4,000			
はくさい	アオムシ、ヨトウムシ			3日	3回
だいこん			100～300		
ブロッコリー	ハスモンヨトウ ヨトウムシ		150～300		2回
はなっこりー	ハスモンヨトウ			前日	
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2,000～4,000		3日	
非結球レタス		4,000	100～300		
ふき	ハスモンヨトウ				
ねぎ	シロイチモジヨトウ		150～200	前日	
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ		100～300		3回
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	4,000～6,000		3日	
ピーマン なす トマト	ハスモンヨトウ	4,000		前日	2回
	オオタバコガ	2,000～4,000			
ししとう	ハスモンヨトウ	4,000			
	オオタバコガ	2,000			
はすいも（葉柄）	ハスモンヨトウ		100～150		
つるな		4,000	150～180	3日	
食用ぎく			200	7日	
食用金魚草			150～200	3日	3回
食用なでしこ			100～300		2回
てんさい	ヨトウムシ	4,000～6,000	100～150	7日	3回
りんご	ハマキムシ類	4,000～6,000	200～700	21日	
	ケムシ類、ヨモギエダシャク	6,000			
	キンモンホソガ	2,000			
おうとう、もも	ハマキムシ類	6,000		3日	
なし	ケムシ類、ハマキムシ類			前日	
茶	チャハマキ	4,000	200～400	摘採7日	2回
	チャノホソガ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク	4,000～8,000			
	ハスモンヨトウ	8,000			

※使用できる収穫前の日数と、本剤及びメトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

中老齢幼虫にも活性が高い

ヨトウムシに対する効果（2000年 社内試験）



てんさい新葉の薬液浸漬法（30秒間）。7日目の死虫数にて計算。

齢のすすんだ幼虫がいなくなる

ハスモンヨトウに対する効果（1999年 高知県農業技術センター）



作物：ピーマン（ビニールハウス、定植：9月27日）
発生量：10月28日に2、3齢幼虫を接種　散布月日：10月29日（栽培初期）

残効性があり、耐雨性に優れる

タマナギンウワバに対する効果（2001年 岩手県農業研究センター）



作物：キャベツ（定植：6月16日）　散布月日：7月10日（結球初期）

有用昆虫に影響が少ない

ミツバチ、マルハナバチなどの受粉昆虫や、幅広い天敵に対して実用濃度で影響がないことが確認されています。

◎ファルコンの影響がないことが確認されている有用昆虫

受粉昆虫天敵類

●セイヨウミツバチ ●マメコバチ ●ツチマルハナバチ（マルハナバチの一種、主に受粉に利用されている種類）
●カタグロミドリカスミカメ ●ズイムシアカタマゴバチ ●ケナガカブリダニ ●オオヒメグモ
●アシナガグモ ●チリカブリダニ ●ヒメハナカメムシ ●コレマンアブラバチ
●オンシツツヤコバチ ●ナミテントウ ●ハモグリミドリヒメコバチ ●イサエアヒメコバチ

⚠ 効果・薬害等の注意

●使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
●使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

●散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
●作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
●桑に付着するおそれのある地域では使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。　●ラベルの記載以外には使用しないでください。　●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は、ほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。　●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。

LINE公式アカウントはじめました!
友だち募集中　最新情報をLINEで配信!
@nichino

販売：NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177　URL:https://www.nichino.co.jp/

製造：コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2025年10月作成版（CO）GC12510S