

水稻用除草剤

ワイードコアTM 1キロ粒剤

ワイードコアTM ジャンボ[®] SD

ワイードコアTM 200SD粒剤

Rinskor[™] active

・すばやい効果発現

効果が早く現れるので、安心して他の作業に集中できます。

・4葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果

散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草*を取りこぼしません。

・ノビエ、SU抵抗性を含む広葉雑草、多年生雑草まで同時防除

圃場ごとに防除雑草がちがっても、この剤ひとつで防除できます。

*草種によって防除できる大きさは異なります。



理想の水田管理を、
あなたに。

A large photograph of a woman wearing a pink hooded poncho and a straw hat, smiling brightly. She is positioned on the right side of the advertisement, with a diagonal white line separating her from a close-up view of a rice paddy field on the left.

*日本草地畜産種子協会「稻発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」で使用できる農薬として記載されています。

 CORTEVA[™]
agriculture

 NICHINO
日本農業株式会社

Visit us at corteva.jp
TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標
ジャンボ[®]は(公財)日本植物調節剤研究協会の登録商標

ワイドコア™ 1キロ粒剤

■農林水産省登録: 第24389号
■有効成分: フロルピラウキシフェンベンジル(通称: リンズコア)…0.40%、ペノキスラム…0.50%、ベンゾビシクロン…2.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	10アールあたり 使用量	総使用回数※	使用方法
移植水稻	一年生雑草、 キシュウスズメノヒエ、 多年生広葉雑草	移植後7日～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで	1kg	本剤: 2回以内 フロルピラウキシフェンベンジル: 3回以内 ペノキスラム: 2回以内 ベンゾビシクロン: 3回以内	湛水散布又は 無人航空機による散布
直播水稻	一年生雑草、ホタルイ、 ウリカワ、ミズガヤツリ、 セリ、ヒルムシロ	稻3葉期～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで			

ワイドコア™ ジャンボ® SD

■農林水産省登録: 第24701号
■有効成分: フロルピラウキシフェンベンジル(通称: リンズコア)…2.0%、ペノキスラム…2.5%、ベンゾビシクロン…10.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	10アールあたり 使用量	総使用回数※	使用方法
移植水稻	一年生雑草、 ホタルイ、マツバイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ	移植後10日～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで	小包装(パック) 10個(200g)	本剤: 2回以内 フロルピラウキシフェンベンジル: 3回以内 ペノキスラム: 2回以内 ベンゾビシクロン: 3回以内	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる。

ワイドコア™ 200SD粒剤


■農林水産省登録: 第24703号
■有効成分: フロルピラウキシフェンベンジル(通称: リンズコア)…2.0%、ペノキスラム…2.5%、ベンゾビシクロン…10.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	10アールあたり 使用量	総使用回数※	使用方法
移植水稻	一年生雑草、 ホタルイ、マツバイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ	移植後10日～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで	200g	本剤: 2回以内 フロルピラウキシフェンベンジル: 3回以内 ペノキスラム: 2回以内 ベンゾビシクロン: 3回以内	湛水散布、 湛水周縁散布又は 無人航空機による散布

※本剤およびそれらの有効成分を含む農薬の総使用回数を示します。

製品名	ノビエ	ホタルイ	コナギ	クサネム	イボクサ	オモダカ	クログワイ	シズイ	ヒメミハギ類	ヒレタゴボウ	アゼガヤ
1キロ粒剤	4葉期まで	4葉期まで	心形葉2葉まで	30cmまで	40cmまで	30cmまで	20cmまで	20cmまで	20cmまで	10cmまで	10cmまで
ジャンボSD 200SD粒剤			4葉期まで			—	—	—	3葉期まで	—	

使用時期の目安(移植水稻)



注意事項(抜粋)

＜共通＞●散布後は水の出入りを止めて、少なくとも3～5日間はそのままの湛水状態を保ち、田面を露出させないよう注意してください。散布後7日間は落水、かけ流しはないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。●散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさせてください。●次のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさせてください。
①砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)
②軟弱な苗を移植した水田
③極端な浅植の水田および浮き苗の多い水田
④稻の根が露出している水田
●使用後に低温が続くと予想される場合には、稻に生育抑制などの薬害が発生するおそれがあるので、使用をさせてください。
●いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
●薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意してください。
●本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
＜1キロ粒剤＞●散布に当たっては、水深3～5cmの湛水状態で田

面に均一に散布してください。
＜ジャンボSD＞●小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意してください。
●水溶性フィルムで小包装した製剤をそのまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
＜1キロ粒剤・200SD粒剤＞●無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
③事前に薬剤の物理特性に合わせて散布装置のメタリング間隔を調整してください。
④散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m離れた位置から圃場内に散布してください。
⑤水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
＜ジャンボSD・200SD粒剤＞●散布に当たっては、水深5～6cmの湛水状態で散布してください。
●藻や浮草が多発している水田では拡散が不十分となり効果の劣る可能性があるので使用をさせてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は、ほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●除防日誌を記帳しましょう。

本資料は2024年8月現在の知見に基づき、作成されています。



販売:  **NICHINO**
日本農業株式会社 東京都中央区
京橋1丁目 19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:<https://www.nichino.co.jp/>

製造: コルテバ・ジャパン株式会社

2024年9月作成版(CO)IQ12409S