



農林水産省登録
第22565号

殺虫剤

アクセルキング[®] フロアブル

幅広い害虫にキングのチカラ!!
感受性の低下した害虫に幅広く効く!



〈写真はイメージです〉



主な適用害虫



かんきつ

ゴマダラカミキリ



チャノキイロアザミウマ



コナガ



アオムシ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



ウワバ類



ハイマダラノメイガ



ネギアザミウマ



アブラムシ類



アブラムシ類



ナモグリバエ

®は日本農薬(株)の登録商標



NICHINO

日本農薬株式会社



アクセルキング フロアブル

有効成分：トルフェンピラド 12.0%

殺虫剤分類 21A

殺菌剤分類 39

メタフルミゾン 19.0%

殺虫剤分類 22B

安全性：医薬用外劇物

特長



1 幅広い効果！

コナガ、アオムシ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、ナモグリバエなど幅広い害虫に優れた効果を発揮します。



2 既存剤抵抗性害虫に有効！

2つの有効成分の働きで、既存剤に感受性の低下した害虫にも安定した効果を示します。

■適用病害虫および使用方法

<2023年4月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ チャノキイロアザミウマ	2000倍	200~ 700ℓ/10a	収穫 7日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、オオタバコガ ウワバ類、ハイマダラノメイガ アブラムシ類、ネギアザミウマ	1000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫 14日前まで				
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類、ナモグリバエ ネギアザミウマ	1000倍						
レタス	オオタバコガ、アブラムシ類 ナモグリバエ、ハスモンヨトウ	1000~ 1500倍						
	ヨトウムシ ウワバ類	1500倍						
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ、ネギアザミウマ	1000倍	収穫 7日前まで	2回以内				
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類	1000倍	発生初期	4回以内	4回以内	6回以内		
きく	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類							

■使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- レタスおよびはくさいの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 周辺作物(なす、トマト、きゅうり、かぶの幼苗期およびこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜)にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう十分注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にはかからないようにしてください。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 天敵昆虫に対して影響があるので注意してください。

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 医薬用外劇物です。取扱いには十分注意してください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさげ、鍵のかかるなるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>

東京都中央区

京橋1丁目

19番8号

2023年6月作成版(ZN)BL12306S