

同時防除に



省力・簡単
使いやすい粒剤



いもち・紋枯病の



稲こうじ病
にも!

手軽で省力的な、いもち・紋枯病同時防除剤です。
優れた防除効果が長く続き、散布回数が軽減できます。
天候に左右されず、処理適期幅も広く余裕をもって使えます。



写真はイメージです

殺菌剤

農林水産省登録 第16841号

フジワン モンカッタ®粒剤

©フジワンモンカッタは日本農薬(株)の登録商標



NICHINO

日本農薬株式会社

※フジワンモンカッタ粒剤は、
「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載。

いもち・紋枯病防除 フジワンモンカット[®]粒剤

有効成分：イソプロチオラン …… 12.0% フルトラニル …… 7.0%

殺菌剤分類 6, 7

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

出穂の20日前、発病株率が10%を越えたら “紋枯病”要防除の注意信号！

出穂の20日前頃は
穂いもちの予防と
紋枯病の上位進展を抑える
重要な時期です。

西日本地域の6月移植稲や麦跡作稲では、
高温のため紋枯病の発病が早くなるので、
出穂30日前に処理してください。

上手な 使い方

■水管理

散布時は田水深を3cm以上にし、散布後3～4日は
湛水状態を保ち、7日間は落水、かけ流しはしないで
ください。

■使用時期

出穂の30～20日前が防除適期に当たります。
（紋枯病の発病株率が30%以下の時に使用してください。）

適用病害虫および使用方法

2023年11月適用拡大

〈2023年11月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソプロチオランを含む 農薬の総使用回数	フルトラニルを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	3～4kg /10a	出穂30～10日前 但し、収穫30日前まで	2回以内	湛水散布	3回以内 （移植前は1回以内、 本田では2回以内）	4回以内
	稲こうじ病	4kg/10a					

注 意 事 項

- 育苗箱には使用しないでください。
- 散布に当たっては、田水深を3cm以上の湛水状態とし、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。なお、極端な漏水田での使用はさけてください。
- 使用適期は通常出穂20日前頃であるが、稲の品種あるいは地域により前後することがあり、また、多発時の散布は効果が劣る場合があります。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



NICHINO 東京都中央区
日本農薬株式会社 京橋1丁目
19番8号
TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>
2024年9月作成版(TS)AX12409S