


効きめが長く、  
散布適期幅が広い!



無人航空機散布に対応



殺菌剤

# モンカット<sup>®</sup> フロアブル

®は日本農薬(株)の登録商標

稲紋枯病に治療・予防の両効果

紋枯病の  
発病株



病斑上の  
菌核




<写真はイメージです>

## 特長

紋枯病にすぐれた効果を示します。  
治療・予防効果にすぐれています。  
散布適期幅が広く、長期間安定した効果が持続します。

## 紋枯病の生活環とモンカットの作用



## 適用病害虫および使用方法 2025年3月適用拡大

〈2025年3月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病	1000～1500倍	60～150ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
		300倍	25ℓ/10a				
		原液	120mℓ/10a				
		30倍	3ℓ/10a				
	8倍	800mℓ/10a	無人航空機による散布				
疑似紋枯症（褐色菌核病菌） 疑似紋枯症（赤色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）	1000倍	60～150ℓ/10a	散布				

## 使用上の注意事項

- 空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
  - ・ 散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - ・ 無人航空機による散布にあっては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
  - ・ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管、その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ・ 散布薬剤の飛散によって自動車やカラートンの塗装等に影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  - ・ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
  - ・ 散布終了後は次の項目を守ってください。
    - (a) 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。
    - (b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 空中散布及び無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意してください。

使用前にはラベルをよく読む。ラベルの記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理する。

LINE公式アカウントはじめました!

友だち募集中 最新情報をLINEで配信!

QRコード

@nichino

**NICHINO** 東京都中央区  
京橋1丁目  
19番8号

日本農薬株式会社

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>