

ダブルシューター™ SE

園芸用殺虫剤

ダブルのパワーで、ねぎの主要害虫を
この1剤が防除！

- 天然物由来の2成分を配合した殺虫剤。
- 難防除害虫のネギアザミウマ、シロイチモジヨトウに有効。
- 泡立ちが少なく調製しやすい製剤。

- ねぎの作物名を「**鱗茎類(葉物、ただし、にら、にら(花茎)を除く)**」に変更しました！
- 「**わけぎ、あさつき、にんにく(花茎)など**」に使えるようになりました！

※詳細は裏面の鱗茎類「鱗茎類(葉物、ただし、にら、にら花茎を除く)」の適用表をご確認ください。



ねぎの主要害虫を発生させない、
増やさない！

既存薬剤に対し薬剤感受性の低下した害虫にも有効！

登録番号：第24055号 ■有効成分：脂肪酸グリセリド…75.0% スピノサド…5.0% ■性状：淡黄色水性和性粘稠懸濁液体 ■有効期限：4年 ■包装：500ml×20本

適用害虫と使用方法（ねぎの登録内容を抜粋）

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数
鱗茎類 (葉物、ただし、にら、にら(花茎)を除く)※	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ネギハモグリバエ	1,000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	—	3回以内

※鱗茎類(葉物、ただし、にら、にら(花茎)を除く)では、「ねぎ」「わけぎ」「あさつき」「ぎょうじゃんにんく」「チャイブ」「にんにく(花茎)」に使えます。


◎その他、きゅうり、メロン、ピーマン及びとうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、すいか、アスパラガス、いちご、花き類・観葉植物にも登録があります。

ねぎに対する上手な使い方


- Point** シロイチモジヨトウ防除の場合、幼虫が若齢のうちに散布してください。齢が進むと薬剤が効きにくくなります。
- Point** 植物全体にむらなく薬液が付着するよう丁寧に散布してください。

試験成績


●シロイチモジヨトウに対する防除効果試験



●試験場所：日本植物防疫協会茨城研究所 ●作物名：ねぎ(浅黄系九条) ●対象害虫：シロイチモジヨトウ ●試験方法：放虫試験 ●調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布2日後、7日後に各区20株の幼虫数を調査し、7日後には各区20株の全葉数と被害葉数を調査し、被害率を求めた ●処理日：2019年6月18日




●アザミウマ類に対する防除効果試験



●試験場所：山形県最上産地研究室 ●作物名：ねぎ(夏扇パワーマ) ●対象害虫：ネギアザミウマ ●試験方法：自然発生試験 ●調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布2日後、7日後、13日後に各区40株の上位3葉に寄生する成幼虫数を調査 ●処理日：2020年6月23日

●ネギハモグリバエに対する防除効果試験



●試験場所：秋田県農業試験場 ●作物名：ねぎ(吉蔵) ●対象害虫：ネギハモグリバエ(B系統混在) ●試験方法：自然発生試験 ●調査方法：薬剤散布直前、薬剤散布7日後、13日後の各区20株の上位3葉に寄生する幼虫数を調査 ●処理日：2020年8月18日

⚠ 使用上の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布してください。
- キャプタンを含む農薬またはアゾキシストロビンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は被害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花卉、苞、葉に被害を生じる場合があるので、事前に安全を確認して使用してください。特に結蕾期以降の散布は注意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれがある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。

- ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意



- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

⚠ 水産動植物に係る注意事項

- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2023年12月現在の知見に基づき、作成されています。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!

レイミー

日農ホームページ

販売: **NICHINO** 東京都中央区
日本農薬株式会社 京橋1丁目
19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

製造: コルテバ・ジャパン株式会社

2023年12月作成版 (CO) GQ22123S