

水稻用初・中期一発処理除草剤

# ライジンパワー® ジャンボ®

直播、  
WCS用稻にも  
使える



雷神パワーでバリッと雑草退治



（写真はイメージです）

## 疾風迅雷の除草効果！SU抵抗性雑草も電撃枯殺！



ノビエ



ホタルイ



コナギ



アゼナ



ヘラオモダカ



ミズガヤツリ

農林水産省登録 第23355号

®は登録商標

# 水稻用初・中期一発処理除草剤



有効成分: インダノファン ..... 2.4%  
ピラクロニル ..... 3.0%  
ベンゾビシクロロン ..... 6.0%  
毒 性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指す)

## 特長

### 1 ベンゾビシクロロンを30g/10a配合

ホタルイなどの問題雑草に長期間安定した効果を発揮します。

### 2 SU抵抗性雑草や多年生雑草に対する優れた効果

ベンゾビシクロロンとピラクロニルとの相乗作用により、ホタルイ、コナギ、アゼナなどのSU抵抗性雑草防除に高い効果を発揮します。  
また、オモダカなどの多年生雑草にも優れた除草効果を示します。

### 3 ノビエに対する速効的な効果

ノビエ防除に定評のあるインダノファンにピラクロニル・ベンゾビシクロロンを混合することで、速効性を高め、安定した除草効果を示します。

## 使用適期(移植水稻)



## 適用雑草および使用方法

<2019年11月現在の登録内容>

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	インダノファンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで				2回以内
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による表層はく離	稻1葉期～ ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	小包装 (パック)10個 (500g)/10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 2回以内 ベンゾビシクロロンを含む農薬の総使用回数 3回以内

鉄コーティング湛水直播には使用できません。

## 注意事項

■ 雜草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがるので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。

■ 苗の植付が均一となるように代かきをていねいに行ってください。未熟な機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。

■ クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイに使用する場合には、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。

■ 湿潤状態(水深5～6cm)で投げ込み散布し、散布後は少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

■ 藻や浮草が多発している水田では拡散が不十分となり効果の劣る可能性があるので使用をさせてください。

■ 下記のような条件では、初期生育抑制を生じるおそれがあるので、使用をさせてください。特に、これらの条件が重なる場合は、初期生育が著しく抑制されるので注意してください。

- ①異常高温の時、あるいは散布後数日以内に梅雨明けになるなど異常高温が予想される時
- ②活着遅延を生じるような異常低温の時
- ③砂質土壤の水田及び漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)
- ④軟弱な苗を移植した水田

- ⑤極端な浅植の水田
- ⑥植え穴のもどりが悪い水田
- ⑦強風下での処理

■ 直播水稻に使用する場合は以下に注意してください。

- ①稻の根が露出した条件下では薬害を生じるおそれがあるので、使用をさせてください。
- ②除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後に散布してください。

■ いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。

■ いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。

■ 敷布田の水田水を他の作物に灌水しないでください。

■ 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。

- ①眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

②皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。

③かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。

■ 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。

■ 敷布後は水管理に注意してください。

■ 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



 **NICHINO**  
日本農薬株式会社  
TEL: 0570-09-1177 URL: https://www.nichino.co.jp/  
東京都中央区京橋1丁目19番8号  
2024年9月作成版(ZN)CE12409S