

水稻用初・中期一発処理除草剤

ダンクショット[®]

B C

フロアブル

新登場



新規有効成分がSU抵抗性雑草にナイスショット!



ナビエ



ホタルイ



ミズアオイ



オモダカ



ミズガヤツリ



写真はイメージです

®は登録商標



NICHINO
日本農薬株式会社

※ダンクショットフロアブルは
「稻発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載



水稻用初・中期一発処理除草剤

ダブルショット® フロアブル

有効成分

カフェンストロール	5.7%
フルピラウキシフェンベンジル	0.94%
ベンゾビシクロン	3.8%

安全性

普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

新規有効成分を配合!

特長1

新規有効成分フルピラウキシフェンベンジル(通称:リンクスコア™)を配合した3成分の混合剤でノビエ、ホタルイ、広葉雑草に高い効果を示します。

特長2

すばやい効果発現!
リンクスコア™の特性により、速効的な効果を示します。

特長3

難防除雑草に高い効果を示す!
ミズアオイやSU抵抗性広葉雑草、イボクサなどの雑草防除に有効です。



TMが付記された表示は、コレバ・アグリサイエンスならびにその関連会社の商標です。

適用雑草および使用方法

2023年4月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ	移植後3日～ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	500ml /10a	1回	原液湛水散布、 水口施用又は 無人航空機 による滴下	1回
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	湛水直播の 稻1葉期～ ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで			原液湛水散布 又は 無人航空機 による滴下	3回以内

鉄コーティング湛水直播には使用できません。

注意事項

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は、生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈15cmまで、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、またオモダカは草丈10cmまで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ミズアオイ(一年生雑草)は5葉期まで、クサネムは草丈20cmまでが本剤の散布適期です。
- オモダカ防除は、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤との組み合せで使用してください。
- 苗の植付けが均一となるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を田面に均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は水深3～5cmの湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させてください。処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達した時に必ず水を止め田面水があふれないように注意してください。
- 直播水稻に使用する場合は、薬害をさけるため稻の1葉期以降に使用し、稻の根が露出している時の使用はさせてください。
- 以下の水田では初期生育抑制を生じるおそれがあるので使用をさせてください。
 - ① 砂質土壤の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - ② 軟弱徒長苗を移植した水田
 - ③ 極端な浅植や深植した水田
- いくさ、れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いくさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



NICHINO
日本農業株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

2024年9月作成版(SPA)FQ12409S