

水稲育苗箱用殺虫殺菌剤

農林水産省登録
第24719号

新登場



リョーガ[®] フェルテラ[®] 粒剤

Powered by
RYNAXYPYR[®]
insecticide



これまでの水稲栽培を凌駕する。



いもち病



イネミズゾウムシ



イネドロオイムシ



ニカメイチュウ



フタオビコヤガ

いもち病、水稲主要害虫を同時防除！

製剤技術の進化がもたらす、
新しい水稲育苗箱用殺虫殺菌剤

は種前から移植当日まで、
いつでも使用可能！！

高密度は種対応



NICHINO
日本農薬株式会社

※リョーガフェルテラ粒剤は
「稲発酵粗飼料生産・技術マニュアル」に記載

⑧リョーガは日本農薬（株）の登録商標、
⑧RYNAXYPYR、⑧フェルテラはFMC Corporation または
その米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標



水稲育苗箱用殺虫殺菌剤

**リョーガ
フェルテラ** 粒剤

Powered by
RYNAXYPYR®
insecticide

有効成分

クロラントラニプロロール…0.75%

殺虫剤分類 28

チアジニル…12.0%

殺菌剤分類 P3

安全性

普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

- 1 育苗箱処理でいもち病、水稲主要害虫*を同時防除できます。
*イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ
- 2 は種前～移植当日処理、移植時の側条施用、高密度は種など、幅広い使用場面で施薬可能です。
- 3 チアジニルを製剤技術で進化させた、新しい長期持続型のいもち病防除剤です。



適用病害虫および使用方法



〈2024年5月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種前	1回	本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)
	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ		は種時(覆土前)～移植当日		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
			移植当日		本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		
	いもち病	高密度には種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り50～100g	は種前		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
稲	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ		は種時(覆土前)～移植当日		側条施用		3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)
	いもち病		移植時				




試験成績



いもち病

山形大学農学部
(2023年)


品種: はえぬき
移植: 5/24
処理: 4/24
調査: 葉いもち 7/18
(処理85日後)
発生状況: 葉いもち 多発生(接種)



イネミズゾウムシ

(一社)宮城県植物防疫協会
(2021年)

品種: ひとめぼれ
移植: 5/8
処理: 5/8
調査: 6/26
(移植49日後)
発生状況: 中発生



■ 注意事項

- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機で移植してください。
- 稲の葉が濡れている場合には、散布前に葉に付いている露を払い落としてから薬剤を散布してください。
- は種時に使用する際は、乾燥状態においては発芽遅延がみられることがあるため適切な水管理を行ってください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗又は苗の生育が不良な場合には、薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾糞として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。

- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、代かきはいないに行い、移植後に田面が露出しないよう注意してください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布してください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



LINE公式アカウントはじめました!
友だち募集中 最新情報を
LINEで配信!



@nichino



NICHINO
日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

TEL:0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>
2024年5月作成版 (KE)JH12405S