
あのフジワンとダントツがひとつに!



「フジワン」のキャラクター
ふじわんこです

水稲育苗箱専用殺虫殺菌剤

フジワン®ダントツ®粒剤

そのまま散布できる
紙パック容器!!



〈写真はイメージです〉

いもち病、水稲初期害虫、ウンカ類を同時防除!



農林水産省登録 第23732号

NICHINO
日本農薬株式会社

®は日本農薬(株)の登録商標

水稲育苗箱専用殺虫殺菌剤

有効成分：クロチアニジン…1.5%、イソプロチオラン…12.0%
安 全 性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

殺虫剤分類	4A
殺菌剤分類	6

フジワン®ダントツ®粒剤



特長

1 育苗箱に処理するだけで、葉いもち、水稲初期害虫、ウンカ類を同時防除できます。

▶フジワンは稲体への吸収移行性に優れ、いもち病に対して長期間防除効果を発揮し、MBI-D剤やQoI剤等の既存薬剤に耐性を持ついもち病菌にも有効です。

▶ダントツはコウチュウ目害虫（イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ）やチョウ目害虫(ニカメイチュウ)に優れた効果を示します。また、ウンカ類やツマグロヨコバイに対しても効果を示し、これらの水稲害虫を同時に防除することができます。

2 そのまま散布できる紙パック容器で簡単に薬剤を散布できます。

3 根の伸長および発根促進効果で、健苗を育成します。




〈写真はイメージです〉

試験成績/ウンカ類（ヒメトビウンカ）



縞葉枯病を媒介するヒメトビウンカ防除に高い効果を発揮します!



埼玉県農林総合研究センター（2014年） 品種:キヌヒカリ 播種日:5/31
処理日:6/22 移植日:6/26 出穂期:8/18 調査日:8/20（移植後55日）
調査方法:捕虫網で10回振り捕獲×3ヶ所 発生状況:中発生（無処理区57匹）

適用病害虫・使用目的および使用方法

<2023年4月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名・使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソプロチオランを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り50g	緑化期～移植当日	1回	本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する	4回以内 移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内	3回以内 （移植前は1回以内、本田では2回以内）
	根の伸長及び発根促進		緑化始期				

注意事項

■育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機で移植してください。

■稲の葉が濡れている場合には、散布前に葉に付いている露を払い落としてから薬剤を散布してください。

■軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。

■本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないよう注意してください。移植後は直ちに入水し、水深2～3cm程度を保ち浅水はさけてください。

■いもち病に対して使用する場合は、移植後およそ6週間を経過すると葉いもちに対する防除効果が弱まるので、移植後葉いもち発生までの期間を考慮して使用してください。なお、天候不順等で葉いもちの発生期間が長びく場合、又は葉いもちの発生がおくれた場合には必要に応じて本田でいもち防除剤を追加散布してください。

■眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

■水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

レイミーの農薬チャットルーム
ホームページに遊びにきてね！



日農ホームページ

NICHINO
日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL：0570-09-1177 URL：https://www.nichino.co.jp/

2023年6月作成版（ZN）DM12306S