

稲こうじ病の防除に

Zボルトー 粉剤DL

ゼット



（写真はイメージです）



墨黒穂病



稲こうじ病



優れた予防効果と
使いやすさで定評の

Zボルドー粉剤DL

ゼット

〔有効成分〕
塩基性硫酸銅：9.0%（銅として5.0%）

殺菌剤分類 M1

安全性：普通物（毒劇物に該当しないもの
を指している通称）

適用病害虫および使用方法（抜粋）

（2023年4月現在の登録内容）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅を含む農薬の 総使用回数
稲	稲こうじ病	3～4kg/10a	出穂10日前まで	—	散布	—
	墨黒穂病	4kg/10a				

（詳しくは製品ラベルをご確認ください）

上手な使い方

最も有効な散布時期は出穂20～10日前です。

出穂20～10日前
Zボルドー粉剤DL



試験成績（稲/稲こうじ病）

■宮城県農業センター

（1986年）

薬剤名	発病率率(%)
Zボルドー粉剤DL 4kg/10a	0.36
無 散 布	3.40

品種：ササニシキ
移植：5月7日
散布：7月31日（出穂14日前）
調査：9月22日
薬害：なし

■日植防東北地区連絡事務所

（1986年 協力：岩手農試）

薬剤名	発病率率(%)
Zボルドー粉剤DL 3kg/10a	0.5
無 散 布	3.0

品種：キヨニシキ
移植：5月22日
散布：7月23日（出穂24日前）
調査：9月25日
薬害：なし

⚠ 使用上の注意

- 稲に使用する場合は薬害を生じ易く、特に出穂期以降は生じ易いので、出穂10日前以降の使用はさけてください。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね！



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

2023年6月作成版(Z)CN22306S