ラリー™ 乳剤

園芸用殺菌剤

ラリー™ 水和剤

園芸用殺菌剤



野菜のさび病・うどんこ病に効く！

- 優れた予防効果と治療効果。
- 作物内に速やかに行き渡る浸透移行性。
- すみずみまで保護するガス効果。



駆け巡る成分で、作物を外と中から守る！

CORTEVA™ agriscience

NICHINO 日本農薬株式会社

Visit us at corteva.jp

TM コルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標

【ラリー水和剤】 ■農林水産省登録：第17684号 ■有効成分：ミクロブタニル・・・10.0%
【ラリー乳剤】 ■農林水産省登録：第17687号 ■有効成分：ミクロブタニル・・・25.0%

乳剤／第2石油類 危険等級Ⅲ・火気厳禁・キシレン

殺菌剤分類 3

■ラリー水和剤 適用病害と使用方法（抜粋）

◎下記作物の他に芝にも適用があります。 使用方法:散布 （※）本剤及びミクロブタニルを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	総使用回数（※）
いちご	うどんこ病	4,000～8,000	150～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
メロン		6,000～8,000			
すいか		4,000～8,000			5回以内
きゅうり					
かぼちゃ					3回以内
なす	すすかび病、うどんこ病	4,000～6,000			4回以内
ピーマン	うどんこ病、斑点病				
とうがらし類					
トマト　ミニトマト	葉かび病	1,000			3回以内
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病	4,000～8,000			
未成熟ささげ		4,000			
アスパラガス	斑点病、茎枯病、褐斑病				2回以内
らっきょう	さび病	2,000		収穫7日前まで	3回以内
ねぎ					
わけぎ					
あさつき				収穫14日前まで	
ぎぼうし				根株養成期 但し、収穫90日前まで	2回以内
葉ごぼう	黒条病	4,000		収穫21日前まで	
たばこ	うどんこ病	6,000	100～180ℓ/10a	収穫10日前まで	
茶	網もち病	1,000	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	
	炭疽病、もち病	1,000～2,000			
りんご	黒星病、赤星病 うどんこ病	2,000～3,000	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内
	斑点落葉病	3,000			
なし	黒星病、赤星病	2,000～3,000		収穫14日前まで	
おうとう	灰星病	2,000		収穫3日前まで	
もも					
いちじく	さび病			収穫前日まで	4回以内
かき	うどんこ病			収穫7日前まで	5回以内

⚠安全使用上の注意

●きゅうり、すいか、メロンに使用する場合、幼苗期の散布は薬害を生ずるおそれがあるので、所定範囲の低濃度で使用してください。
●メロン（アールス系）では、生育前半（着果前）の散布は薬害を生ずる場合があるので、所定範囲の低濃度（8000倍）で使用してください。
●さやえんどうのうどんこ病に対しては、多発生下では効果が不十分な場合があるので、所定範囲の高濃度で使用してください。
●りんごの斑点落葉病に対しては、落花20日頃までの初期防除剤として使用してください。
●粉末は眼に対して刺激性がありますので、眼に入らないように注意し、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。

■ラリー乳剤 適用病害と使用方法

使用方法:散布 （※）本剤及びミクロブタニルを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	総使用回数（※）
いちご	うどんこ病	5,000	150～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
トマト ミニトマト	葉かび病	2,500～5,000			
	すすかび病	2,500			
ねぎ	さび病	4,000		収穫14日前まで	
にんにく				収穫3日前まで	
しそ		3,000		収穫7日前まで	2回以内
しそ（花穂）				収穫21日前まで	
ふき	うどんこ病	4,000		収穫7日前まで	3回以内
ふき（ふきのとう）	うどんこ病、さび病			収穫60日前まで	
食用金魚草	さび病	3,000		収穫14日前まで	2回以内
食用ぎく	白さび病		200～300ℓ/10a		
きく					
ばら	うどんこ病、黒星病	3,000～6,000		発病初期	5回以内
やなぎ	さび病	3,000			

⚠安全使用上の注意

●ばらに使用する場合、ハウスでの散布は薬害を生じるおそれがあるので、所定範囲の低濃度（6000倍）で使用してください。
●原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器・空袋は、ほ場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2025年7月現在の知見に基づき、作成されています。

LINE公式アカウントはじめました!
友だち募集中 最新情報をLINEで配信!
@nichino

販売: NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

製造: コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

2025年10月作成版（CO）GT12510S