



てんさい専用
除草剤

ビートアップ[®]
フロアブル

®は登録商標

直播てんさいにも
使用可

Beetup

豊作の秋に
鼓動が高鳴る♪



〈写真はイメージです〉

有効成分フェンメディファムが、てんさい畠の広葉雑草を的確に防除！
においの少なさや希釈液の安定性が高く、作業性に優れます！



シロザ



ハコベ



ノボロギク



イヌタデ



オオツメクサ



NICHINO
日本農薬株式会社



UPL ビートアッププロアブルの製造元
ユーピーエルジャパン合同会社

■有効成分: フェンメディファム 16.0%
■安 全 性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特 長

- 1 有効成分フェンメディファムが、てんさい畠の広葉雑草を的確に防除します。
- 2 においが少なく希釈時や散布時の作業がしやすい薬剤です。
- 3 有効成分が細かく薬剤中に分散しているため、希釈水に速やかに分散し、安定性が高いです。
- 4 直播てんさいにも使用でき、効率的な雑草防除が可能になります。

適用雑草および使用方法

(2022年9月現在の登録内容)


| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンメディファムを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|---------|--------------------------------------|--|--|---------|----------------------|----------------------|
| | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| てんさい (移植栽培) | 一年生広葉雑草 | 育苗期の本葉展開後 (雑草発生初期) | 0.5~0.75ml/m ² 1.0~1.5ml/ ペーパーポット6冊 (0.5~0.75ml/m ²) | 150ml/m ² 300ml/ ペーパーポット6冊 (150ml/m ²) | 3回以内 | 雑草茎葉散布 又は 全面散布 | 3回以内 |
| | | 移植活着後、 中耕後雑草発生初期 但し、収穫60日前まで | 400~600ml/10a | 50~100l/10a | | | |
| | | 第2本葉展開後、 中耕後雑草発生初期 但し、収穫60日前まで | | | | | |
| | | 子葉展開期~本葉抽出期 雑草発生初期 但し、収穫60日前まで | 200~350ml/10a | | | | |

上手な使い方

移植てんさい



直播てんさい



※一般的なモデルを示しています。実際の防除は、産地の防除スケジュールおよび登録内容をご確認ください。

注意事項

●本剤は、雑草の茎葉処理剤なので雑草の発生後に処理してください。ただし、雑草が大きくなると効果が劣るので適期に散布してください。●てんさい以外の作物には薬害を生じるおそれがあるので、てんさい以外の作物に飛散しないように注意してください。●散布直後に降雨が予想される場合には使用をさけてください。●散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。●育苗期処理においては噴口を苗から30cm以上離してください。また二度掛けは行わないでください。育苗床の土壌が乾燥していると効果が劣る場合があるので、本剤の散布前日に散水し育苗床を湿らせておいてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO
日本農薬株式会社

東京都中央区
京橋 1丁目
19番8号

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>

2023年6月作成版(KE)DZ12306S