農林水産省登録
第２３８０２号

てんさい専用
除草剤

ビートアップ®
フロアブル

®は登録商標

Beetup

直播てんさいにも
使用可

〈写真は、イメージです〉

♪ 豊作の秋に
鼓動が高鳴る♪

有効成分フェンメディファムが、てんさい畑の広葉雑草を的確に防除！
においの少なさや希釈液の安定性が高く、作業性に優れます！

シロザ

ハコベ

ノボロギク


イヌタデ

オオツメクサ

NICHINO
日本農薬株式会社

てんさい専用除草剤

ビートアップ®フロアブル

UPL ビートアップフロアブルの製造元
ユーピーエルジャパン合同会社

■有効成分：フェンメディファム ……16.0%
■安　全　性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特　長

1. 有効成分フェンメディファムが、てんさい畑の広葉雑草を的確に防除します。
2. においが少なく希釈時や散布時の作業がしやすい薬剤です。
3. 有効成分が細かく薬剤中に分散しているため、希釈水に速やかに分散し、安定性が高いです。
4. 直播てんさいにも使用でき、効率的な雑草防除が可能になります。

適用雑草および使用方法

2026年6月適用拡大

（2026年6月現在の登録内容）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
てんさい（移植栽培）	一年生広葉雑草	育苗期の本葉展開後（雑草発生初期）	0.5～0.75mℓ/㎡	150mℓ/㎡	3回以内	雑草茎葉散布又は全面散布	3回以内
			1.0～1.5mℓ/ペーパーポット6冊（0.5～0.75mℓ/㎡）	300mℓ/ペーパーポット6冊（150mℓ/㎡）			
		移植活着後、中耕後雑草発生揃期 但し、収穫60日前まで	400～600mℓ/10a	50～100ℓ/10a			
てんさい（直播栽培）		第2本葉展開後、中耕後雑草発生揃期 但し、収穫60日前まで					
		子葉展開期～本葉抽出期 雑草発生揃期 但し、収穫60日前まで	150～350mℓ/10a				

上手な使い方

移植てんさい



直播てんさい



※一般的なモデルを示しています。実際の防除は、産地の防除スケジュールおよび登録内容をご確認ください。

注意事項

●本剤は、雑草の茎葉処理剤なので雑草の発生後に処理してください。ただし、雑草が大きくなると効果が劣るので適期に散布してください。●てんさい以外の作物には薬害を生じるおそれがあるので、てんさい以外の作物に飛散しないように注意してください。●散布直後に降雨が予想される場合には使用をさけてください。●散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。●育苗期処理においては噴口を苗から30cm以上離してください。また二度がけは行わないでください。育苗床の土壌が乾燥していると効果が劣る場合があるので、本剤の散布前日に散水し育苗床を湿らせておいてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

LINE公式アカウントはじめました!
友だち募集中
最新情報をLINEで配信!
@nichino

NICHINO 日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
TEL：0570-09-1177　URL：https://www.nichino.co.jp/

2026年6月作成版（KE）DZ12606S