

投げ込み簡単省力化。

日農

投げ込み用
水稲用初・中期一発処理除草剤

マセカリル[®]

ジャンボ[®]

®は登録商標

投げ込むだけで
抵抗性雑草を
バツサリ！



アゼナ



コナギ



ミゾハコベ



イボクサ



ホタルイ



NICHINO

日本農薬株式会社



〈写真はイメージです〉


日農 マサカリ L ジャンボ®

有効成分:インダノファン…2.8% クロメプロップ…7.0% ペンスルフロンメチル…1.0%
安全性:普通物(毒劇物に該当しないものを指す)という通称)

SU抵抗性雑草(アゼナ、コナギ、ミゾハコベ、ホタルイ等)◆ 難防除雑草(イボクサ等)に 優れた効果を発揮!



上手な使い方



※初期剤との体系でも使用できます。

適用雑草および使用方法

<2023年4月現在の登録内容>

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	インダノファンを含む農薬の総使用回数	クロメプロップを含む農薬の総使用回数	ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ クログワイ(北陸、九州を除く) オモダカ(九州を除く) ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土～埴土	小包装 (パック) 10個 (500g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる	北陸、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国の普通期 及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内
		移植後5日～ ノビエ2葉期 ただし、移植後 30日まで					九州の普通期栽培地帯			
							九州の早期栽培地帯			

■使用上の注意事項

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは2葉期まで、クログワイ、オモダカは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が散布適期です。
- クログワイ及びオモダカに使用する場合、有効な他剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の植付が均一となるように代かきを怠らないで行ってください。未熟有機物を施用した場合は特に怠らないで行ってください。
- 湛水状態(水深5～6cm)で投げ込み散布し、散布後は少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 葉や浮草が多発している水田では拡散が不十分となり効果の劣る可能性がありますので使用を避けてください。
- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用してください。
- 下記のような条件では薬害が発生する恐れがあるので使用を避けてください。
1) 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上) 2) 軟弱な苗を移植した水田 3) 極端な浅植の水田及び植付不良で根が田面に露出している状態 4) 強風下での処理
- 梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けてください。
- 散布後数日間暑い高温が続く場合、初期生育が抑制されることがありますが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。
- いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害する恐れがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用の場合は、十分注意してください。●散布田の水田水を他の作物に灌水しないようにしてください。
- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしないでください。
- 水溶性フィルムが破綻した場合は次の点に注意してください。1. 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせてください。2. 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の処置を受けてください。3. 皮膚に対して弱い刺激性があるので、付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。4. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。●散布後は水管理に注意してください。●空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。

●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177

URL:https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

2023年6月作成版(SPA)BI12306S