



園芸用殺虫剤

問題害虫から大切なりんごを守り、豊かな実りを支えます。

- ・ハマキムシ類、シンクイムシ類に優れた効果
- ・収穫前日まで使用可能



ハマキムシ類、シンクイムシ類に優れた効果

各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対し、防除効果を発揮します。

収穫前日まで使用可能

■適用害虫と使用方法(抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5,000～10,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ	5,000～15,000					

◎その他、もも、ネクタリン、おうとう、かき、なし、小粒核果類、すもも、うめ、ぶどう、かんきつ、いちじく、ブルーベリー、マンゴー、くり、さんしょう(果実)、アロニアにも登録があります。

△ 使用上の注意



- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。



△ 安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク・手袋・長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかかるないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
 ●空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2022年11月現在の知見に基づき、作成されています。

レイミーの農薬チャットルーム

ホームページに遊びにきてね！



日農ホームページ



販売：



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414

ホームページアドレス <https://www.nichino.co.jp/>

製造：コルテバ・ジャパン株式会社

2022年11月作成(CO)HP12211S