



殺ダニ剤

ダニコンゴ ポアール®

ハダニを
おどして
退かせよう!!



(写真はイメージです)

新規有効成分が
ハダニを
パワフルに撃退!!



りんご



かき



おうとう



なし



かんきつ



いちご



茶

農林水産省登録 第23946号 ®は日本農薬株式会社の登録商標



殺ダニ剤

ダニコング フロアブル

有効成分: ピフルプミド..... 20.0%


殺虫剤分類 25B

安全性: 普通物

(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- 新しいタイプの殺ダニ剤** 新規作用性を有し、既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。
- 残効性に優れる** 残効性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。
- 天敵・有用昆虫に優しい** 天敵・有用昆虫を含む非標的昆虫・クモ類への安全性が高く、訪花性昆虫や天敵等の生物資材との併用にも適しています。



適用病害虫および使用方法

(2023年4月現在の登録内容)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピフルプミドを含む農薬の総使用回数 |
|--|------------------|------------|--------------|---------|---------|------|-------------------|
| かんきつ | ミカンハダニ | 2000~4000倍 | 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| かき | ハダニ類 | 2000倍 | | | | | |
| りんご なし もも ネクタリン いちじく おうとう | | | | | | | |
| ぶどう | ハダニ類 ブドウヒメハダニ | 2000倍 | 100~700ℓ/10a | 2回以内 | 2回以内 | | |
| 小粒核果類 | ナミハダニ | 3000倍 | 100~300ℓ/10a | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | |
| アスパラガス | ハダニ類 | | | | | | |
| なす すいか ピーマン メロン いちご | | | | | | | |
| しそ | カンザワハダニ | 2000~4000倍 | 200~400ℓ/10a | 摘採7日前まで | ※ | 発生初期 | |
| しそ(花穂) | | | | | | | |
| みょうが(花穂) | | | | | | | |
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300ℓ/10a | | | | |
| 茶 | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300ℓ/10a | | | | |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 2000倍 | 100~300ℓ/10a | | | | |

※みょうが(花穂)の収穫前日まで。但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用をさけてください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにしてねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね!



日農ホームページ



NICHINO

日本農薬株式会社

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

2023年6月作成版(ZN)CS12306S